

冠筒基部,花丝离生,背部与副花冠裂片合生,花药倒卵形,在柱头顶贴连,药隔上的膜片在柱头顶合生;子房具2枚离生心皮,被柔毛,柱头隆起。蓇葖叉生成直线,长圆状披针形,长9—13厘米,直径5—7毫米,被绒毛;种子长圆形,长6毫米,宽2毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长3.5厘米。花期5—8月,果期9—12月。

产于广西和云南。生于海拔300—1000米山地疏林中或丘陵、山谷密林中,攀援树上。印度、缅甸、越南、老挝、柬埔寨和马来西亚等有分布。模式标本采自印度支那。

4. 翅果藤属*——*Myriopteron* Griff.

Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. 4: 385. 1844.

木质藤本,具乳汁。叶对生,膜质,具长柄,羽状脉。聚伞花序圆锥状,疏散,腋生;花小;花萼5裂,裂片双盖覆瓦状排列,花萼内面基部具5个小腺体;花蕾阔圆锥状;花冠辐状,花冠筒短,花冠裂片5枚,狭;副花冠为5枚鳞片组成,与花丝同着生于花冠的基部,鳞片上部丝状,基部阔;雄蕊生于花冠的基部,花丝下部相连成一环,花药顶端具膜片;花粉器匙形,其上部载花粉器藏有许多四合花粉,下部有1花粉器柄和粘盘;子房具2枚离生心皮,每心皮有胚珠多个,柱头隆起,顶端2裂。蓇葖椭圆状长圆形,基部膨大,外果皮具有很多膜质的纵翅;种子顶端具白色绢质种毛。

1种,产于我国西南各省区。分布于印度、缅甸、泰国、越南、老挝、印度尼西亚和马来西亚等。

本属模式种为: *Myriopteron extensum* (Wight) K. Schum.

翅果藤(中国高等植物图鉴) 奶浆果(广西); 大对节生(云南新平); 野甘草(云南元江); 婆婆针线包(云南) 图版 93

Myriopteron extensum (Wight) K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 215, fig. 64-k. 1895; Craib in Kew Bull. Misc. Inf. 1911: 415. 1911; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 35. 1912; Tsiang in Sunyatsenia 2: 177. 1934, oo. cc. 3: 161. 1936, 4: 97. 1939; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 992. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 464, 图 4882. 1974.——*Streptocaulon extensum* Wight, Contrib. Bot. Ind. 65. 1834.——*Myriopteron paniculatum* Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. 4: 385. 1844.——*Streptocaulon extensum* Wight var. *paniculatum* Kurz, For. Fl.

* 翅果藤属(中国高等植物图鉴), 别名婆婆针线包属(中国植物科属检索表), 多翅果属(中国种子植物科属辞典)。