

炎、跌打损伤、胃痛、消化不良、闭经、疟疾等。

3. 青蛇藤(峨眉植物图志) 黑骨头、鸡骨头、铁夹藤、管人香、乌骚风(广西);宽叶凤仙藤(云南植物名录) 图版 95

Periploca calophylla (Wight) Falc. in Proc. Linn. Soc. **1**: 115. 1841; Decne. in DC. Prodr. **8**: 498. 1844; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 12. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **26**: 101. 1889; Schltr. et Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 541. 1900; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. **3**: 343. 1916; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 179. 1934, oo. cc. **3**: 161. 1936, **4**: 98. 1939, in Fang, Ic. Pl. Omei. **2**(2): Pl. 193. 1946; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 992. 1936; 中国高等植物图鉴, **3**: 466, 图 4885. 1974. ——*Streptocaulon calophyllum* Wight, Contr. Bot. Ind. **65**. 1834, et Ill. Ind. **2**: 230, t. 182, fig. 1. 1850.

藤状灌木,具乳汁;幼枝灰白色,干时具纵条纹,老枝黄褐色,密被皮孔;除花外,全株无毛。叶近革质,椭圆状披针形,长4.5—6厘米,宽1.5厘米,顶端渐尖,基部楔形,叶面深绿色,叶背淡绿色;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉纤细,密生,两面扁平,叶缘具一边脉;叶柄长1—2毫米。聚伞花序腋生,长2厘米,着花达10朵;苞片卵圆形,具缘毛,长1毫米;花蕾卵圆形,顶端钝;花萼裂片卵圆形,长1.5毫米,宽1毫米,具缘毛,花萼内面基部有5个小腺体;花冠深紫色,辐状,直径约8毫米,外面无毛,内面被白色柔毛,花冠筒短,裂片长圆形,中间不加厚,不反折;副花冠环状,着生在花冠的基部,5—10裂,其中5裂延伸为丝状,被长柔毛;雄蕊着生在花冠的基部,花丝离生,背部与副花冠合生,花药卵圆形,渐尖,背部被长柔毛,花药彼此相连并贴生在柱头上;花粉器匙形,四合花粉藏在载粉器内,基部粘盘卵圆形,粘生柱头上;子房无毛,心皮离生,胚珠多个,花柱短,柱头短圆锥状,顶端2裂。蓇葖双生,长箸状,长12厘米,直径5毫米;种子长圆形,长1.5厘米,宽3毫米,黑褐色,顶端具白色绢质种毛;种毛长3—4厘米。花期4—5月,果期8—9月。

产于西藏、四川、贵州、云南、广西及湖北等省区。生于海拔1000米以下的山谷杂树林中。尼泊尔、印度和锡金也有分布。模式标本采自尼泊尔。

茎皮纤维可编制绳索及造纸原料。茎可药用,治腰痛、风湿麻木、跌打损伤及蛇咬伤等。

4. 多花青蛇藤(中国高等植物图鉴)

Periploca floribunda Tsiang, in Sunyatsenia **2**: 180, Pl. 33. 1934.

藤状灌木,具乳汁,枝条灰褐色,除花外,全株无毛。叶近革质,长圆状披针形至



图版 95 青蛇藤 *Periploca calophylla* (Wight) Falc., 1.花枝; 2.花; 3.花萼; 4.雄蕊, 示花药背部具长柔毛; 5.雌蕊; 6.花粉器背面观; 7.花粉器腹面观; 8.蓇葖; 9.种子。(吴翠云仿绘)