

椭圆状长圆形,长4.7—5.5厘米,宽1—1.6厘米,顶端渐尖,基部楔形,边缘略反卷;侧脉纤细,密生,两面均扁平,有边脉;叶柄长3毫米。聚伞花序腋生,三歧,长3.5厘米,着花达20朵;苞片卵圆形,长1毫米,有缘毛;花萼裂片膜质,卵圆形,长1.5毫米,宽1毫米,花萼内面有5个小腺体;花冠深紫色,辐状,外面无毛,内面被柔毛,花冠筒长1毫米,裂片镊合状或略向右覆盖排列,长圆形,长4毫米,宽2毫米,顶端急尖;副花冠环状,生于花冠基部,10裂,其中5裂片呈鳞片状,另5裂则延伸为线形钻状,具有长柔毛;花丝离生,背部与副花冠合生,花药背部被长柔毛,并围绕于柱头;花粉器匙形,四合花粉藏于载粉器内;子房由2枚离生心皮组成,无毛,花柱短,柱头盘状五角形;每心皮有胚珠多个。花期9月。

产于云南。生于海拔1800米山地林中。模式标本采自腾冲。

6. 须药藤属*——*Stelmatocrypton* H. Baill.

H. Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris 2: 812. 1889, et Hist. Pl.

10: 300. 1890.

缠绕木质藤本,具乳汁。叶对生,具柄,羽状脉。花小,黄绿色,排列成具短梗的腋生聚伞花序;花萼小,5裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部具有腺体;花冠近钟状,花冠筒短,裂片5,向右覆盖;副花冠裂片5,卵形,与花丝同着生在花冠的基部,并与花丝合生;雄蕊5,花丝离生,花药长卵形,顶端具长毛,伸出花喉之外;花粉器匙形,载粉器内藏有许多四合花粉,载粉器柄长,粘盘粘在柱头基部;子房具2枚离生心皮,胚珠多个。蓇葖叉生成直线,成熟时开裂;种子顶端具种毛。

1种,产于我国贵州、云南和广西。分布于印度。

本属模式种为: *Stelmatocrypton khasianum* (Benth.) H. Baill.

须药藤(中国种子植物科属辞典) 生藤、香根藤、水逼药、冷水发汗、够哈哄(云南) 图版 96

Stelmatocrypton khasianum (Benth.) H. Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris 2: 812. 1889, et Hist. Pl. 10: 300. 1890; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 221. 1895; Tsiang in Sunyatsenia 4: 99. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 466, 图 4886. 1974. ——*Periploca khasiana* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 740, 746. 1876. ——*Pentanura khasiana* Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 196. 1877;

* 须药藤属(中国种子植物科属辞典),别名须叶藤属(中国植物科属检索表)。