

3. 叶狭小, 宽 3 毫米以下, 通常线形或长圆状披针形, 无透明腺点 3. 丽江鲫鱼藤 *S. likiangensis* Tsiang
3. 叶较大, 宽 1—2.5 厘米, 椭圆形、椭圆状卵圆形, 有透明腺点。
4. 总花梗曲折; 叶顶端尾状渐尖 4. 鲫鱼藤 *S. lanceolata* Bl.
4. 总花梗不曲折; 叶顶端锐尖或急尖。
5. 叶顶端锐尖, 基部楔形; 老枝条无皮孔 5. 催吐鲫鱼藤 *S. szechuanensis* Tsiang et P. T. Li
5. 叶顶端急尖或钝, 基部宽楔形或浑圆; 老枝条具有皮孔 6. 斑叶鲫鱼藤 *S. bonii* Cost.

1. 吊山桃(广西) 细叶青藤(广西) 图版 102 (1—3)

Secamone sinica Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 997. 1936; Tsiang in Sunyatsenia 4: 55. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 467, 图 4888. 1974. — *Secamone esquirolii* Schltr. ex Lév. Fl. Kouy-Tchéou 44. 1914, nom. nud.

藤状灌木, 长达 8 米, 具有乳汁; 幼枝略被有锈色疏柔毛。叶纸质, 卵状披针形, 长 2—7 厘米, 宽约 2 厘米, 顶端渐尖, 基部近圆形或宽楔形, 具有透明腺点, 叶面无毛, 叶背被有短柔毛; 侧脉 6—10 条, 在叶面扁平, 在叶背略凸起, 斜曲上升, 至叶缘前网结; 叶柄长 2—5 毫米, 幼时被疏短柔毛, 老时毛渐脱落。聚伞花序腋生, 或近顶生, 具短的总花梗, 着花 2—6 朵, 密被锈色疏柔毛; 花梗长 5 毫米; 小苞片卵圆形, 长约 1 毫米, 急尖; 花萼裂片宽卵形, 长 1 毫米, 具细缘毛, 内面基部具有小腺体; 花冠黄色, 近辐状, 花冠筒短, 裂片长圆形, 长约 2 毫米, 向右覆盖, 内面有乳头突起; 副花冠裂片侧面扁平, 镰刀状, 比合蕊柱短; 花粉块 4 个, 系结于着粉腺上, 直立; 花药顶端具内弯的膜片; 子房无毛, 花柱短, 柱头短圆锥状; 胚珠每室多个。蓇葖纺锤状披针形, 长 4—6 厘米, 直径 7 毫米, 无毛; 种子褐色, 长圆形, 长 1.3 厘米, 宽 5 毫米, 基部浑圆, 两侧反卷, 顶端狭, 具白色绢质种毛; 种毛长 3.5 厘米。花期 5—6 月, 果期 9—10 月。

产于广东、广西、云南和贵州。生长于丘陵山地疏林中或溪旁密林荫处, 攀援于树上。模式标本采自贵州西南部。

叶可供药用, 壮筋骨, 补精催乳。

2. 锈毛鲫鱼藤(海南植物志)

Secamone ferruginea Pierre ex Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 44, fig. 6 (13-17). 1912; Tsiang in Sunyatsenia 4: 56. 1939; 海南植物志, 3: 257. 1974.

藤状灌木, 具乳汁; 小枝被有短柔毛, 老时被毛渐脱落。叶薄纸质, 卵状披针形, 长 4.5—6 厘米, 宽 1.2—2.5 厘米, 顶端渐尖, 基部钝, 边缘反卷, 叶面深绿色, 叶背被



图版 102 1—3. 吊山桃 *Secamone sinica* Hand.-Mazz., 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 种子。
4—6. 催吐鲫鱼藤 *Secamone szechuanensis* Tsiang et P. T. Li, 4. 花; 5. 花冠展开, 示合蕊柱
和副花冠; 6. 花粉器。(吴翠云绘)