

标本采自四川峨边。

根有毒,中毒症状为呕吐。

6. 斑皮鲫鱼藤(新拟)

Secamone bonii Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 43. 1912.

藤状灌木,具乳汁;老枝条击褐色,被灰白色皮孔;除幼枝和花序外,全株无毛。叶椭圆形或卵状披针形,长3—4.5厘米,宽1.5—2.8厘米,顶端急尖,稀渐尖,基部宽楔形,叶面深绿色,叶背浅绿色;中脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉不明显;叶柄长2—3毫米,被微毛。聚伞花序腋生,比叶为短,长1.5—2厘米;花序梗和花梗纤细被微毛;小苞片被微毛;花小,花萼裂片卵圆形,外面被短柔毛,边缘有缘毛;花冠淡黄色,辐状,花冠筒短,裂片卵圆形,钝头;雄蕊上的副花冠裂片镰刀状;花药顶端具膜片;花粉块每室2个,4个花粉块连结于着粉腺上;子房由2枚离生心皮组成,柱头圆锥状。蓇葖叉生,长圆状披针形,长5—6.5厘米,基部直径约1厘米,基部膨大,无毛;种子长圆形,长约8毫米,宽3毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长3.5厘米。花期5—7月,果期8—10月。

产于广东海南。生长于低海拔杂木林中。越南也有分布。模式标本采自越南河内。

3. 马利筋亚科——Subfam. Asclepiadoideae Airy Shaw

Airy Shaw, Willis Dict. Fl. Pl. Ferns rev. ed. 7, 96. 1966.

花粉块在每个药室内藏1个,每个花粉器有花粉块2个,固定于1个较大而紫红色有柄的着粉腺上。花丝合生成合蕊冠。

本亚科我国有3族。

5. 马利筋族——Trib. Asclepiadeae G. Don

G. Don, Gen. Hist. 4: 139. 1837.

花粉块下垂;着粉腺背面有1缝线,固定于具角的柱头上;花粉块柄长短不一,通常下垂而弯曲的。

本族我国产14属。

11. 乳突果属*——*Adelostemma* Hook. f.

* 乳突果属(中国高等植物图鉴),别名无冠藤属(中国植物科属检索表)。