

1—1.5 厘米, 两端渐尖; 种子卵圆形, 长约 6 毫米, 宽 3 毫米, 顶端具白色绢质种毛; 种毛长 2.5 厘米。花期几乎全年, 果期 8—12 月。

广东、广西、云南、贵州、四川、湖南、江西、福建、台湾等省区均有栽培, 也有逸为野生和驯化。原产拉丁美洲的西印度群岛。现广植于世界各热带及亚热带地区。

全株有毒, 尤以乳汁毒性较强, 含强心甙, 称白微甙, 可作药用, 可除虚热利小便, 调经活血、止痛、退热消炎散肿驱虫之效。

1a. 黄冠马利筋(新拟)

*Asclepias curassavica* Linn. cv. *Flaviflora*. —— *Asclepias curassavica* Linn. f. *flaviflora* Tawada in Journ. Jap. Bot. 47(7): 203. 1972.

花冠黄色。

栽培于广东南部和广西西部。日本也有。

### 18. 钉头果属\* —— *Gomphocarpus* R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1: 37. 1810.

灌木或半灌木, 具乳汁。叶对生或轮生, 线形或长圆形, 叶缘常反卷, 具柄, 羽状脉。聚伞花序枝顶腋生, 着花多朵; 花萼 5 深裂, 裂片内面基部有腺体; 花冠 5 深裂, 辐状, 或反折, 裂片在花蕾时镊合状排列; 副花冠通常红色, 兔状或舟形或凹形; 花药顶端具薄膜片; 花粉块每室 1 个, 长圆形, 下垂; 子房由 2 枚离生心皮组成, 柱头顶端五角状, 肉质。蓇葖肿胀, 外果皮有软刺; 种子长圆形, 顶端具白色绢质的种毛。

约 50 种, 产于热带非洲。我国栽培 1 种。

本属模式种为: *Gomphocarpus arborescens* (L.) R. Br.

钉头果(云南) 图版 142

*Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1: 38. 1810; Pobed. in Komarov Fl. URSS. 18: 668, Tab. 36—3. 1952; 中国高等植物图鉴, 3: 488, 图 4930. 1974. —— *Asclepias fruticosa* Linn. Sp. Pl. 216. 1753.

灌木, 具乳汁; 茎具微毛。叶线形, 长 6—10 厘米, 宽 5—8 毫米, 顶端渐尖, 基部渐狭而成叶柄, 无毛, 叶缘反卷; 侧脉不明显。聚伞花序生于枝的顶端叶腋间, 长 4—6 厘米, 着花多朵; 花萼裂片披针形, 外面被微毛, 内面有腺体; 花蕾圆球状; 花冠宽卵圆形或宽椭圆形, 反折, 被缘毛; 副花冠红色兔状; 花药顶端具薄膜片; 花粉块长圆形, 下

\* 钉头果属(中国高等植物图鉴)。



图版 142 钉头果 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br., 1.花枝; 2.果枝; 3.花; 4.种子。(杨可四绘)

垂。蓇葖肿胀，卵圆状，端部渐尖而成喙，长5—6厘米，直径约3厘米，外果皮具软刺，刺长1厘米；种子卵圆形，顶端具白色绢质种毛；种毛长约3厘米。花期夏季，果期秋季。

原产地地中海，现欧洲各地也有栽培。我国华北及云南栽培作药用。

全株浸剂可治小儿肠胃病；茎片作催嚏剂；叶可治肺痨；乳汁可作灌肠剂。茎皮和种毛含纤维素81.5%，可作填充物。

### 19. 白水藤属\*—*Pentastelma* Tsiang et P. T. Li

Tsiang et P. T. Li in Fl. Hainan. 3: 262, 577. 1974.

攀援灌木，具乳汁。叶对生，具柄，羽状脉。聚伞花序伞形状，腋生；花蕾卵圆形，顶端急尖；花萼5深裂，内面基部具腺体；花冠近钟状，5深裂，花冠裂片向右覆盖；副花冠5片，与合蕊柱合生，而在其背部直立隆起成侧面平板状；雄蕊5枚，与雌蕊贴生，花药顶端具膜片，覆盖着柱头，花丝合生成筒；花药2室，每室藏有花粉块1个，圆球状，下垂；子房由2枚离生心皮所组成，花柱圆柱状，柱头盘状五角形，顶端略凸起；每心皮有胚珠多颗，着生于腹缝线胎座上。

1种，我国特产，产于广东海南。

白水藤(海南植物志) 图版143

*Pentastelma auritum* Tsiang et P. T. Li in Fl. Hainan. 3: 262, 577. Pl. 710. 1974.; 中国高等植物图鉴, 3: 489, 图4931. 1974.

攀援灌木，除叶柄略有微毛外，全株无毛。叶薄膜质，长圆状披针形，长6—13厘米，宽1.5—3.5厘米，顶端长渐尖成尾状，基部耳形；中脉在叶面扁平，在叶背略为隆起；叶柄长1—2厘米。伞形状聚伞花序腋生，着花3—5朵，长约3厘米；花序梗及花梗均纤细；花蕾卵圆形，顶端急尖；花萼内面基部有5个小腺体；花冠浅红色，深5裂，裂片狭披针形，长7毫米，宽2.5毫米，向右覆盖；副花冠5片，与合蕊柱合生，而在其背部直立隆起成侧面平板状；花药顶端的膜片透明而覆盖着柱头；花粉块球圆状，下垂；子房卵球状，心皮离生，无毛，花柱圆筒状，柱头盘状五角形，顶端略为凸起。花期12月。

产于广东海南。生长于山地花岗岩区丘陵山谷中。模式标本采自保亭吊罗山白水岭。

\* 白水藤属(海南植物志)。