

标本采自印度。

2. 夜来香(植物名实图考) 夜香花、夜兰香(广州) 图版 163

Telosma cordata (Burm. f.) Merr. in Philip. Journ. Sci. **19**: 372. 1921; 侯宽昭等, 广州植物志, 497. 1956; 中国高等植物图鉴, **3**: 497, 图 4947. 1974; 海南植物志, **3**: 268, 图 716. 1974. — *Asclepias cordata* Burm. f. Fl. Ind. 72, fig. 2. 1768. — *Cynanchum odoratissimum* Lour. Fl. Cochinch. 166. 1790. — *Pergularia odoratissima* Sm. Ic. Pict. Pl. 16. 1793. — *Pergularia minor* Andr. Bot. Repos. t. 184. 1797. — *Telosma odoratissima* Coville in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb **9**: 384. 1905. — *Telosma minor* Craib in Kew Bull. **1911**: 418. 1911.

柔弱藤状灌木; 小枝被柔毛, 黄绿色, 老枝灰褐色, 渐无毛, 略具有皮孔。叶膜质, 卵状长圆形至宽卵形, 长 6.5—9.5 厘米, 宽 4—8 厘米, 顶端短渐尖, 基部心形; 叶脉上被微毛; 基脉 3—5 条, 侧脉每边约 6 条, 小脉网状; 叶柄长 1.5—5 厘米, 被微毛或脱落, 顶端具丛生 3—5 个小腺体。伞形状聚伞花序腋生, 着花多达 30 朵; 花序梗长 5—15 毫米, 被微毛, 花梗长 1—1.5 厘米, 被微毛; 花芳香, 夜间更盛; 花萼裂片长圆状披针形, 外面被微毛, 花萼内面基部具有 5 个小腺体; 花冠黄绿色, 高脚碟状, 花冠筒圆筒形, 喉部被长柔毛, 裂片长圆形, 长 6 毫米, 宽 3 毫米, 具缘毛, 干时不折皱, 向右覆盖; 副花冠 5 片, 膜质, 着生于合蕊冠上, 腹部与花药粘生, 下部卵形, 顶端舌状渐尖, 背部凸起有凹刻; 花药顶端具内弯的膜片; 花粉块长圆形, 直立; 子房无毛, 心皮离生, 每室有胚珠多个, 花柱短柱状, 柱头头状, 基部五棱。蓇葖披针形, 长 7—10 厘米, 渐尖, 外果皮厚, 无毛; 种子宽卵形, 长约 8 毫米, 顶端具白色绢质种毛。花期 5—8 月, 极少结果。


原产于我国华南地区。生长于山坡灌木丛中, 现南方各省区均有栽培。亚洲热带和亚热带及欧洲、美洲均有栽培。

花芳香, 尤以夜间更盛, 常栽培供观赏。华南地区有取其花与肉类煎炒作饌。花可蒸香油。花、叶可药用, 有清肝、明目、去翳之效, 华南地区民间有用作治结膜炎、疳积上眼症等。

3. 华南夜来香(中国高等植物图鉴) 图版 164

Telosma cathayensis Merr. in Sunyatsenia **2**: 18, Pl. 9. 1934; Masamune, Fl. Kainant. 268. 1943; 中国高等植物图鉴, **3**: 497, 图 4948. 1974; 海南植物志, **3**: 269. 1974.

藤状灌木; 小枝被微毛, 老枝无毛。叶薄膜质, 长圆形或长圆状椭圆形, 长 6—12



图版 164 华南夜来香 *Telosma cathayensis* Merr., 1.花枝; 2.花; 3.花冠展开; 4.合蕊柱和副花冠; 5.雌蕊; 6.雄蕊和副花冠裂片的侧面观; 7.花粉器。(吴翠云绘)

厘米,宽 3—5 厘米,顶端急尖或短渐尖,基部宽楔形或圆形,两面无毛,仅在脉上被微毛;侧脉每边 6 条;叶柄长 1.5—3 厘米,被微毛。聚伞花序伞形状,腋生,着花多朵;总花梗长 1—1.5 厘米,被微毛;花梗长约 1 厘米,被微毛;花萼裂片薄,长圆状椭圆形,长 3.5 毫米,宽 2 毫米,外面被疏柔毛;花冠淡绿色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,内面喉部被长柔毛,裂片长圆形,长 8 毫米,宽 2.5 毫米,顶端圆或近截形,展开,被缘毛;副花冠裂片顶端舌状渐尖,向内弯,背部隆起;花药顶端具长圆形膜片;花粉块长圆形,直立;子房无毛,花柱短柱状,柱头短圆锥状。 花期夏季。

产于广东、广西和云南。生长于海拔 500 米以下山地疏林向阳处。模式标本采自广东罗浮山。

4. 卧茎夜来香(海南植物志)

Telosma procumbens (Blanco) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. **7**: 243. 1912, et in Lingnan Sci. Journ. **11**: 54. 1932; 海南植物志, **3**: 269. 1974. — *Pergularia procumbens* Blanco, Fl. Filip. 201. 1837. — *Pergularia filipes* Schltr. in Perk. Frag. Fl. Philip. **1**: 135. 1904.

藤状灌木;小枝柔弱,无毛或被微毛。叶薄膜质,卵圆形至长圆状卵圆形,长 8—13 厘米,宽 3—8 厘米,顶端渐尖,基部圆形,截形或略心形;叶脉上略被微毛;叶柄长 3.5 厘米。聚伞花序伞形状,腋生,着花多朵;花序梗长约 3 厘米;花梗长约 1 厘米,纤细,被微柔毛;花蕾下部卵圆形,上部披针形;花萼裂片卵圆形,外面被微毛和缘毛,内面基部有小腺体;花冠黄绿色,无香味,花冠筒长 5 毫米,外面无毛,内面有 5 排二列毛,喉部更密,裂片长圆形,长 8 毫米,宽 3 毫米,外面无毛,内面基部被微毛,裂片向右覆盖;副花冠裂片膜质,顶端呈舌状渐尖,背部隆起;花药顶端膜片与副花冠裂片等高;花粉块长圆形,直立;子房无毛,心皮离生,花柱短柱状,向上膨大,柱头短圆锥状。蓇葖披针形,长 10 厘米,直径 2 厘米;种子扁平,顶端具白色绢质种毛。 花期 5 月,果期秋季。

产于广东海南。生长于山地溪旁灌木丛中。菲律宾也有。模式标本采自菲律宾。