

厘米,宽 3—5 厘米,顶端急尖或短渐尖,基部宽楔形或圆形,两面无毛,仅在脉上被微毛;侧脉每边 6 条;叶柄长 1.5—3 厘米,被微毛。聚伞花序伞形状,腋生,着花多朵;总花梗长 1—1.5 厘米,被微毛;花梗长约 1 厘米,被微毛;花萼裂片薄,长圆状椭圆形,长 3.5 毫米,宽 2 毫米,外面被疏柔毛;花冠淡绿色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,内面喉部被长柔毛,裂片长圆形,长 8 毫米,宽 2.5 毫米,顶端圆或近截形,展开,被缘毛;副花冠裂片顶端舌状渐尖,向内弯,背部隆起;花药顶端具长圆形膜片;花粉块长圆形,直立;子房无毛,花柱短柱状,柱头短圆锥状。 花期夏季。

产于广东、广西和云南。生长于海拔 500 米以下山地疏林向阳处。模式标本采自广东罗浮山。

4. 卧茎夜来香(海南植物志)

Telosma procumbens (Blanco) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. **7**: 243. 1912, et in Lingnan Sci. Journ. **11**: 54. 1932; 海南植物志, **3**: 269. 1974. — *Pergularia procumbens* Blanco, Fl. Filip. 201. 1837. — *Pergularia filipes* Schltr. in Perk. Frag. Fl. Philip. **1**: 135. 1904.

藤状灌木;小枝柔弱,无毛或被微毛。叶薄膜质,卵圆形至长圆状卵圆形,长 8—13 厘米,宽 3—8 厘米,顶端渐尖,基部圆形,截形或略心形;叶脉上略被微毛;叶柄长 3.5 厘米。聚伞花序伞形状,腋生,着花多朵;花序梗长约 3 厘米;花梗长约 1 厘米,纤细,被微柔毛;花蕾下部卵圆形,上部披针形;花萼裂片卵圆形,外面被微毛和缘毛,内面基部有小腺体;花冠黄绿色,无香味,花冠筒长 5 毫米,外面无毛,内面有 5 排二列毛,喉部更密,裂片长圆形,长 8 毫米,宽 3 毫米,外面无毛,内面基部被微毛,裂片向右覆盖;副花冠裂片膜质,顶端呈舌状渐尖,背部隆起;花药顶端膜片与副花冠裂片等高;花粉块长圆形,直立;子房无毛,心皮离生,花柱短柱状,向上膨大,柱头短圆锥状。蓇葖披针形,长 10 厘米,直径 2 厘米;种子扁平,顶端具白色绢质种毛。 花期 5 月,果期秋季。

产于广东海南。生长于山地溪旁灌木丛中。菲律宾也有。模式标本采自菲律宾。