

产于我国台湾的 *Dregea formosana* Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **43**: 219, fig. 1. 1968., 我们未见标本, 故本志未有收入。


分种检索表

1. 叶宽卵形或卵状心形, 或近圆形, 基部心形或浅心形, 或截形。
 2. 叶背几无毛, 叶基部浅心形或截形; 蓇葖被白粉, 外果皮具皱纹纵棱 1. 南山藤 *D. volubilis* (L. f.) Benth. ex Hook. f.
 2. 叶背被绒毛, 叶基部浅心形; 蓇葖平滑或具横凸起的皱褶片状。
 3. 蓇葖平滑无皱褶。 2. 丽子藤 *D. yunnanensis* (Tsiang) Tsiang et P. T. Li
 4. 叶长 1.3—3 厘米, 宽 0.9—2.5 厘米; 花直径 8—10 毫米 2a. 丽子藤 (原变种) *D. yunnanensis* (Tsiang) Tsiang et P. T. Li var. *yunnanensis*
 4. 叶长达 8 厘米, 宽达 5.5 厘米; 花直径 11—12 毫米 2b. 大丽子藤 *D. yunnanensis* (Tsiang) Tsiang et P. T. Li var. *major* (Tsiang) Tsiang et P. T. Li
 3. 蓇葖外果皮具波纹或具横凸起的皱褶片状 3. 苦绳 *D. sinensis* Hemsl.
 5. 蓇葖外果皮具波纹; 子房无毛 3a. 苦绳 (原变种) *D. sinensis* Hemsl. var. *sinensis*
 5. 蓇葖外果皮具横凸起的皱褶片状; 子房被毛 3a. 贯筋藤 *D. sinensis* Hemsl. var. *corrugata* (Schneid.) Tsiang et P. T. Li
1. 叶长椭圆形, 基部楔形 4. 楔叶南山藤 *D. cuneifolia* Tsiang et P. T. Li

1. 南山藤 (中国高等植物图鉴) 假夜来香、春筋藤、双根藤 (广东); 大果咀彭、假猫豆 (广西); 各山消 (贵州); 苦凉菜、苦菜藤 (云南元江); 帕格牙姆、帕空耸 (傣语) 图版 183

Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 46. 1883; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **11**: 54. 1932; 中国高等植物图鉴, **3**: 509, 图 4971. 1971; 海南植物志, **3**: 275, 图 719. 1974. — *Asclepias volubilis* Linn. f. Suppl. 170. 1781. — *Tylophora macrantha* Hance in Journ. Bot. **20**: 79. 1882. — *Wattakaka volubilis* (L. f.) Stapf in Curtis's Bot. Mag. **148**: sub. t. 8976. 1923; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 201. 1934, op. cit. **6**: 148. 1941.

木质大藤本; 茎具皮孔, 枝条灰褐色, 具小瘤状凸起。叶宽卵形或近圆形, 长 7—15 厘米, 宽 5—12 厘米, 顶端急尖或短渐尖, 基部截形或浅心形, 无毛或略被柔毛; 侧脉每边约 4 条; 叶柄长 2.5—6 厘米。花多朵, 组成伞形状聚伞花序, 腋生, 倒垂; 花序梗长 2—4 厘米, 被微毛; 花梗长 2—2.5 厘米; 花萼裂片外面被柔毛, 内面有腺体多个; 花冠黄绿色, 夜吐清香, 裂片广卵形, 长约 8 毫米, 宽 6 毫米; 副花冠裂片生于雄蕊的背面, 肉质膨胀, 内角呈延伸的尖角; 花粉块长圆形, 直立; 子房被疏柔毛, 花柱短,



图版 183 南山藤 *Dregea volubilis* (L. f.) Benth. ex Hook. f., 1.花枝; 2.花; 3.花萼展开示腺体; 4.花冠展开; 5.合蕊柱和副花冠; 6.雌蕊; 7.花粉器; 8.蓇葖; 9.种子。(陈国泽仿绘)

柱头厚而顶端具圆锥状凸起。蓇葖披针状圆柱形,长 12 厘米,直径约 3 厘米,外果皮被白粉,具多皱棱条或纵肋;种子广卵形,长 1.2 厘米,宽 6 毫米,扁平,有薄边,棕黄色,顶端具白色绢质种毛;种毛长 4.5 厘米。花期 4—9 月,果期 7—12 月。

产于贵州、云南、广西、广东及台湾等省区。生长于海拔 500 米以下山地林中,常攀援于大树上,间有栽培于农村中。分布于印度、孟加拉、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾。模式标本采自孟加拉。

茎皮纤维可作人造棉、绳索;种毛作填充物。根可药用,作催吐药;茎利尿、止肚痛,除郁湿;全株可治胃热和胃痛。果皮的白霜可作兽医药。嫩叶可食。

2. 丽子藤(植物分类学报) 滇假夜来香(云南植物名录)

Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 129. 1974. — *Wattakaka yunnanensis* Tsiang in Sunyatsenia **4**: 126. 1939, op. cit. **6**: 150. fig. 19. 1941.

2a. 丽子藤(原变种) 图版 184

Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li var. **yunnanensis**

攀援灌木,全株具乳汁,除花冠和合蕊柱外,全株均被小茸毛,老茎被毛渐脱落。叶纸质,卵圆形,长 1.3—3 厘米,宽 0.9—2.5 厘米,基部心形,叶面被短柔毛,叶背被淡黄色的微茸毛,老渐脱落;侧脉每边约 4 条,在叶背凸起;叶柄长 0.5—2.5 厘米,顶端具 3—4 个丛生小腺体。伞形状聚伞花序腋生,长达 5 厘米,着花达 15 朵;花萼裂片卵圆形,花萼内面基部具 5 个小腺体;花冠白色,辐状,裂片卵圆形,长 5 毫米,宽 3.5 毫米,顶端钝而微凹,具脉纹,边缘被缘毛;副花冠裂片肉质,背面圆球状凸起,顶端内角延伸成尖角,与花药顶端的膜片近等高;花粉块长圆状,直立;子房被疏柔毛,花柱短圆柱状,柱头圆锥状,基部五角形,顶端短 2 裂。蓇葖披针形,长 3.5—5 厘米,直径 5—7 毫米,外果皮被微毛,老渐脱落,平滑无皱褶;种子卵圆形,长 7 毫米,宽 4 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2 厘米。花期 4—8 月,果期 10 月。

产于云南、四川和甘肃等省。生长于海拔 3500 米以下山地林中。模式标本采自云南。

2b. 大丽子藤(植物分类学报)

Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li var. **major** (Tsiang) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 129. 1974. — *Wattakaka yunnanensis* Tsiang var. **major** Tsiang in Sunyatsenia **6**: 151. 1941.

与原变种的不同在于:叶长达 8 厘米,宽达 5.5 厘米;花直径 11—12 毫米。花