

产于云南南部。生长于海拔 1070 米山地林中。模式标本采自西双版纳。

10. 三分丹(广东) 蛇花藤、黎针(广西);毛果娃儿藤(通称) 图版 199

Tylophora atrofalliculata Metcalf in Lingnan Sci. Journ. **11**: 265, fig. 1. 1932; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 223. 1936, op. cit. **4**: 128. 1939; 中国高等植物图鉴, **3**: 514, 图 4982. 1974; 海南植物志, **3**: 280. 1974.

攀援灌木;须根丛生;全株被锈黄色糙硬毛,茎缠绕。叶坚纸质,卵状长圆形,长 4.5—10.5 厘米,宽 2.5—6 厘米,顶端渐尖,基部心形至圆形,侧脉每边 5—6 条;叶柄长 1—2 厘米。聚伞花序腋生或腋外生,着花 10 余朵;花蕾圆球状;花小,黄绿色;花萼 5 深裂,外面被糙硬毛;花冠近钟状,外面被长柔毛,裂片长圆形,基部向右覆盖;副花冠裂片 5 枚,卵形,贴生于合蕊冠上,背面肉质隆肿,顶端钝,高仅达花药的基部;花粉块每室 1 个,近圆球状,直立;花药顶端有圆形膜质,内弯向柱头;心皮离生;柱头五角状,顶端凸起。蓇葖双生,叉开成一直线,短披针形,长 4.5 厘米,直径 1.5 厘米,密被锈黄色短柔毛;种子长 6 毫米,有薄边,顶端具白色绢质种毛;种毛长 1.5 厘米。花期 3—8 月,果期 9—12 月。

产于广东、广西和云南。生长于海拔 800 米以下山地疏密林中及旷野、平原的灌木丛中。模式标本采自广东儋县。

根可药用,民间有用作风湿、跌打损伤、四肢麻痹、瘀血作痛、经脉阻滞、心悸盗汗、哮喘、毒蛇咬伤等。

11. 娃儿藤(云南植物名录) 白龙须、哮喘草(广东、广西、湖南);三十六荡、三十六根(广东、广西);落地金瓜、关腰草、藤细辛、落地蜘蛛、土细辛(广西);缠竹消、金钱吊丝馅、虾箱须、落土香(广东);黄芽细辛(湖南);藤霸王、小霸王(云南思茅);卵叶娃儿藤(通称)

Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. Nomencl. ed. 2, **2**: 726. 1841; Merr. in Lingn. Sci. Journ. **13**: 45. 1934; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 223. 1936, op. cit. **4**: 129. 1939; 中国高等植物图鉴, **3**: 515, 图 4983. 1974; 海南植物志, **3**: 280. 1974.——*Diplolepis ovata* Lindl. in Trans. Hort. Soc. London **6**: 286. 1826.——*Tylophora hispida* Decne. in DC., Prodr. **8**: 610. 1844; Metc. in Lingn. Sci. Journ. **11**: 266, fig. 2—3. 1932.

11a. 娃儿藤(原变种) 图版 200

Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. var. **ovata**

攀援灌木;须根丛生;茎上部缠绕;茎、叶柄、叶的两面、花序梗、花梗及花萼外面