

片披针形,尖;果实被毛,顶端凹陷,直径7—9毫米……………2.砂引草 *M. sibirica* L.

1. 银毛树(海南植物志)

Messerschmidia argentea (L. f.) Johnst. in Journ. Arn. Arb. **16**: 164. 1935; Hara, Enum. Sperm. Jap. **1**: 178. 1948; Johnst. in Journ. Arn. Arb. **32**: 121. 1951; Li, Wood. Fl. Taiwan 815. 1963; 海南植物志 **3**: 459. 图 857. 1974; J. Y. Hsiao in Fl. Taiwan **4**: 404. 1978. — *Tournefortia argentea* L. f. Suppl. Pl. 133. 1781; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 145. 1883; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 146. 1890; Gagnep. et Cour. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 215. 1914. — *T. arborea* Blanco, Fl. Filip. 129. 1837.

小乔木或灌木,高1—5米;小枝粗壮,密生锈色或白色柔毛。叶倒披针形或倒卵形,生小枝顶端,长7—13厘米,宽2—4厘米,先端钝或圆,自中部以下渐狭为叶柄,上下两面密生丝状黄白色毛。镰状聚伞花序顶生,呈伞房状排列,直径5—10厘米,密生锈色短柔毛;花萼肉质,无柄,长1.5—2毫米,5深裂,裂片长圆形,倒卵形或近圆形,外面密生锈色短柔毛,内面仅基部被毛或近无毛,长约为花冠的1/2;花冠白色,筒状,长2.5—3毫米,裂片卵圆形,开展,长约2毫米,比花筒长,外面仅中央具1列糙伏毛,其余无毛;雄蕊稍伸出,花药卵状长圆形,长约1毫米,花丝极短,不明显,着生花冠筒基部以上4—5毫米处;子房近球形,无毛,花柱不明显,柱头2裂,基部为膨大的肉质环状物围绕。核果近球形,直径约5毫米,无毛。 花果期4—6月。

产海南岛、西沙群岛及台湾。生海边沙地。日本、越南及斯里兰卡有分布。

2. 砂引草(中国种子植物科属辞典)

Messerschmidia sibirica L. Mant. Pl. **2**: 334. 1771; Johnst. in Journ. Arn. Arb. **16**: 164. 1935; Kitag. in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. 4. 91. 1936; Johnst. in Journ. Arn. Arb. **32**: 118. 1951. — *Tournefortia sibirica* L. Sp. Pl. 141. 1753; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 147. 1890. — *T. arguzia* Roem. et Schul. var. *latifolia* DC. Prodr. **9**: 514. 1845. — *T. sibirica* L. var. *grandiflora* H. Winkl in Repert. Sp. Nov. **12**: 472. 1922. — *Messerschmidia sibirica* var. *latifolia* (DC.) Hara, Enum. Sperm. Jap. **1**: 178. 1948.

2a. 砂引草(原变种) **Messerschmidia sibirica** L. var. *sibirica*

多年生草本,高10—30厘米,有细长的根状茎。茎单一或数条丛生,直立或斜升,通常分枝,密生糙伏毛或白色长柔毛。叶披针形、倒披针形或长圆形,长1—5厘米,宽6—10毫米,先端渐尖或钝,基部楔形或圆,密生糙伏毛或长柔毛,中脉明显,上面凹陷,下面突起,侧脉不明显,无柄或近无柄。花序顶生,直径1.5—4厘米;萼片披针形,长3—4毫米,密生向上的糙伏毛;花冠黄白色,钟状,长1—1.3厘米,裂片卵形或长圆形,外弯,花冠筒较裂片长,外面密生向上的糙伏毛;花药长圆形,长2.5—3毫米,先端具短尖,花丝极