

多年生草本,高(15)20—25(30)厘米。茎数条丛生,不分枝,生微毛,基部有枯叶残基宿存。基生叶披针形或椭圆状披针形,长3—5.5厘米,宽0.8—1.5厘米,先端渐尖或急尖,两面生柔毛,下面较密,叶柄长3—6厘米;茎生叶较小,叶柄长1厘米或近无柄。花序2或3(4)个束生茎顶,分枝上有4—10朵花形成1—2回轮伞状聚伞花序;花梗长3—6毫米,生微毛,花期直立,果期伸长;花萼裂片卵状长圆形,花期长约1毫米,直立,果期可达1.5毫米,直立或平展,先端急尖,被糙伏毛;花冠白色,钟状辐形,筒长约0.75—1毫米,檐部直径约6毫米,裂片圆卵形,长1.5—2毫米,附属物半月形,顶端2圆裂,有乳突;花药宽椭圆形,长约0.5毫米;花柱长约1毫米;雌蕊基高约1毫米。小坚果背腹两面体型,除棱缘的刺外,长2—3毫米,宽1—1.5毫米,背面卵状三角形,平或微凸,密被糙毛,腹面龙骨状突起,有粒状疣突和微糙毛,着生面位腹面中部以下,棱缘的刺三角形或披针形,长0.2—0.5毫米,先端有锚状钩,基部分离或稍连合。花果期6—7月。

产新疆和田。生海拔3200米草原。苏联中亚地区有分布。

5. 宽叶齿缘草

Eritrichium latifolium Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. **15**: 403. 1842; Ledeb. Fl. Ross. **3**: 150.; Lipsky in Acta Hort. Petrop. **26**: 532. 1910; M. Pop. in Fl. URSS **19**: 489. 1953. — *E. betissovii* Rgl. in Acta Hort. Petrop. **6**: 340. 1880.

多年生草本,高15—30厘米。茎数条丛生,不分枝,生柔毛,基部有枯叶残柄宿存。基生叶数枚,叶片披针形或椭圆状披针形,长3—5.5厘米,宽0.8—1.5厘米,先端圆钝,基部渐狭,两面密生开展或半开展的柔毛,柄长3—5厘米;茎生叶披针形,长4—1厘米,宽1.2—0.5厘米,先端锐尖,基部宽楔形或楔形。花序2—3个生于茎顶;花梗长3—6毫米,生微毛,最下部花的花梗长可达3厘米;花萼裂片卵状长圆形至卵状披针形,长约1毫米,果期稍增大,外面密被伏毛,内面近无毛;花冠白色,钟状辐形,筒长约1毫米,檐部直径约6毫米,裂片倒卵形,附属物明显伸出喉部,近半圆形,肥厚,基部中心有乳突;花药长圆形;雌蕊基高约1毫米;花柱长约1毫米。小坚果背腹两面体型,除棱缘的刺外,长2.5—3毫米,宽1.5—2毫米,背面卵形或宽卵形,微凸,生短毛,腹面生微毛,着生面卵形,位腹面中部,棱缘的锚状刺三角状披针形,长0.5—1.2毫米,基部分离或连合成翅。

产新疆天山北坡、和田、乌库。生海拔2000—3200米草坡、河滩灌丛林缘。苏联中亚地区有分布。

6. 对叶齿缘草

Eritrichium pseudolatifolium M. Pop. in Fl. URSS **19**: 708, 494, 400. pl. 19. fig. 1. 1953. — *E. latifolium* Lipsky in Acta Hort. Petrop. **26**: 530. 1910, p. p.

多年生草本,高10—20厘米。茎数条丛生,被短柔毛,上部常二叉分枝,基部密被枯叶残基。基生叶柄长3—9厘米;叶片卵形或椭圆形,长1—2(2.5)厘米,宽0.8—1.3厘米,先端钝,基部近圆形,下面被有基盘和无基盘的短伏毛,上面毛极少或几无毛;茎生叶