

直立灌木或小乔木，高约 6 米；嫩枝疏生星状毛，老枝几无毛。叶片椭圆形、长圆状卵形至长圆形，厚纸质，长 7.5—15 厘米，宽 4—7 厘米，全缘，顶端渐尖或急尖，基部阔楔形至圆形，两面有黄色腺点，沿叶脉有星状毛，尤以背面为密；叶柄四棱形，长 1.5—3.5 厘米，有星状毛。聚伞花序组成顶生塔形圆锥花序，长 6—8 厘米，宽 3.5—4 厘米，花序梗长 1.5—2.5 厘米，有星状毛；苞片线形，长不逾 5 毫米；花萼钟状，外被星状毛，顶端稍不规则的 5 浅裂，裂齿极短，钝三角形；花冠外被星状毛，二唇形，上唇圆形或顶端微凹，下唇 3 裂，中间一裂片圆形，两侧裂片卵形，管内喉部有一圈长柔毛；雄蕊 4，2 长 2 短；花柱长 3—4 毫米，柱头 2 裂。核果圆球形，直径 3—5 毫米。 花果期 7—9 月。

产广东省高要县鼎湖山。生于山地河旁丛林中。印度、缅甸等地也有分布。

2. 狐臭柴 (云南植物志) 斑鸠占、神仙豆腐柴、臭树、臭黄荆 (贵州)，水白腊 (四川)，长柄臭黄荆 (中国高等植物图鉴)

*Premna puberula* Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. N. Ser. 17: 701. 1910; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 371. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 226. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 85. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 905. 1936, pro parte, excl. syn.; 中国高等植物图鉴 3: 590. 图 5133. 1974; 云南植物志 1: 421. 图版 100, 8. 1977.——*Premna microphylla* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 256. 1890, pro parte, quoad plantam e Hupeh et Szechuan; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 548. 1900, pro parte, non Turcz.——*Premna martini* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 440. 1912 et Fl. Kouy-Tcheou 443. 1915.——*Premna subcordata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 40: 487. 1926.

2a. 狐臭柴 (原变种) 图 42

var. *puberula*

直立或攀援灌木至小乔木，高 1—3.5 米；小枝近直角伸出，幼枝绿色，常疏被柔毛，老枝变无毛，黄褐色至紫褐色。叶片纸质至坚纸质，卵状椭圆形、卵形或长圆状椭圆形，通常全缘或上半部有波状深齿、锯齿或深裂，长 2.5—11 厘米，宽 1.5—5.5 厘米，顶端急尖至尾状尖，基部楔形、阔楔形或近圆形，很少微呈心形，绿色，干时带褐色，两面近无毛至疏生短柔毛，无腺点，侧脉在叶背面较表面显著隆起，细脉极细，在叶表面有时下陷，微显现，在叶背面极清晰可见；叶柄腹平背凸，长 (0.5) 1—2—(3.5) 厘米，通常无毛。聚伞花序组成塔形圆锥花序，生于小枝顶端，长 4—14 厘米，宽 2—9 厘米，无毛至疏被柔毛；苞片披针形或线形；花有长 1—1.2 (—3) 毫米的柄；花萼杯状，长 1.5—2.5 毫米，外被短柔毛和黄色腺点，顶端 5 浅裂，裂齿三角形，齿缘有纤毛；花冠淡黄色，有紫色或褐色条纹，长 5—7 毫米，4 裂成二唇形，下唇 3 裂，上唇圆形，顶端微缺，外面密被腺点，喉部有数行较长的毛，花冠管长约 4 毫米；雄蕊二强，着生花冠管中部以下，伸出花冠外，花丝无毛；子房