

为阔楔形至近圆形,叶背面有很清晰的细脉等主要特征可以区别。本种被毛情况,由被毛至不太被毛以至光滑均连接而不可分割,故不再分出变种。

4. 臭黄荆 (中国高等植物图鉴) 斑鹊子、斑鸠站、女贞叶腐婢、短柄腐婢(四川中药志) 图 44

Premna ligustroides Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 256. 1890; Diels in Bot. Jahrb. 29: 548. 1900; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 372. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 226. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 78. pl. 18. 1932; 中国高等植物图鉴 3: 589. 图 5131. 1974.

灌木,高1—3米;多分枝,枝条细弱,幼枝有短柔毛。叶片卵状披针形至披针形,长1.5—8厘米,宽1—3厘米,全缘或中部有3—5钝齿,顶端渐尖或急尖,基部楔形,两面疏生有毛,背面有紫红色腺点;有短柄或近无柄。聚伞花序组成顶生圆锥花序,被柔毛,长3.5—6厘米,宽2—3厘米,最下分枝长0.5—1厘米;花萼杯状,长约2毫米,外面有毛和腺点,内面疏生腺点,顶端稍不规则5裂,裂片圆形或钝三角形,长不逾1毫米;花冠黄色,长3—5毫米,两面有茸毛和黄色腺点,顶端4裂略成二唇形,上唇1裂片宽,顶端截平或微凹,下唇3裂片稍不相等,中间1裂片较长;雄蕊4,2枚稍长;子房无毛,上部有黄色腺点;花柱长约4毫米。核果倒卵球形,长2.5—5毫米,宽2.5—4毫米,顶端有黄色腺点。花果期5—7月。

产四川、贵州、湖北及江西。生于海拔500—1000米的山坡林中或林缘。模式标本采自四川岷江流域。

根、叶、种子入药,能除风湿,清邪热,治痢疾、痔疮、脱肛、牙痛等症(《四川中药志》)。

本种似豆腐柴 *P. microphylla* Turcz., 但后者叶片较大,花序分枝较长,最下分枝长逾1厘米;花冠长约7毫米等性状可以区别。

5. 塘虱角 (中国高等植物图鉴) 大蛇药、牛尾鸟(广东) 图 45

Premna sunyiensis P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 84. Pl. 19. 1932;




图 44 臭黄荆 *Premna ligustroides* Hemsl.
(蒋杏墙绘)