

为阔楔形至近圆形,叶背面有很清晰的细脉等主要特征可以区别。本种被毛情况,由被毛至不太被毛以至光滑均连接而不可分割,故不再分出变种。

4. 臭黄荆 (中国高等植物图鉴) 斑鹊子、斑鸠站、女贞叶腐婢、短柄腐婢(四川中药志) 图 44

Premna ligustroides Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 256. 1890; Diels in Bot. Jahrb. 29: 548. 1900; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 372. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 226. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 78. pl. 18. 1932; 中国高等植物图鉴 3: 589. 图 5131. 1974.

灌木,高1—3米;多分枝,枝条细弱,幼枝有短柔毛。叶片卵状披针形至披针形,长1.5—8厘米,宽1—3厘米,全缘或中部有3—5钝齿,顶端渐尖或急尖,基部楔形,两面疏生有毛,背面有紫红色腺点;有短柄或近无柄。聚伞花序组成顶生圆锥花序,被柔毛,长3.5—6厘米,宽2—3厘米,最下分枝长0.5—1厘米;花萼杯状,长约2毫米,外面有毛和腺点,内面疏生腺点,顶端稍不规则5裂,裂片圆形或钝三角形,长不逾1毫米;花冠黄色,长3—5毫米,两面有茸毛和黄色腺点,顶端4裂略成二唇形,上唇1裂片宽,顶端截平或微凹,下唇3裂片稍不相等,中间1裂片较长;雄蕊4,2枚稍长;子房无毛,上部有黄色腺点;花柱长约4毫米。核果倒卵球形,长2.5—5毫米,宽2.5—4毫米,顶端有黄色腺点。花果期5—7月。

产四川、贵州、湖北及江西。生于海拔500—1000米的山坡林中或林缘。模式标本采自四川岷江流域。

根、叶、种子入药,能除风湿,清邪热,治病疾、痔疮、脱肛、牙痛等症(《四川中药志》)。

本种似豆腐柴 *P. microphylla* Turcz., 但后者叶片较大,花序分枝较长,最下分枝长逾1厘米;花冠长约7毫米等性状可以区别。

5. 塘虱角 (中国高等植物图鉴) 大蛇药、牛尾鸟(广东) 图 45

Premna sunyiensis P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 84. Pl. 19. 1932;




图 44 臭黄荆 *Premna ligustroides* Hemsl.
(蒋杏墙绘)

中国高等植物图鉴 3: 590. 图 5134. 1974.

直立或攀援灌木, 高 1—2 米; 幼枝、叶柄及花序略被棕褐色或暗灰色茸毛。叶片纸质,




图 45 塘虱角 *Premna sunyiensis* P'ei
(史渭清绘)

卵形至卵状披针形, 长 3—7.5 厘米, 宽 1—4.5 厘米, 全缘, 顶端渐尖, 基部阔楔形或近圆形, 两面近无毛, 背面有褐色腺点, 侧脉 3—5 对, 在叶背面凸起; 叶柄长 0.6—2 厘米, 上面有纵沟。顶生塔形圆锥花序长 5—12 厘米, 宽 2.5—4 厘米; 苞片线状披针形或线形, 长 2—6 毫米, 有茸毛; 花萼长约 1.5 毫米, 结果时稍增大, 在花蕾时有毛, 以后变无毛, 外面有褐色腺点, 有明显纵脉, 顶端 5 浅裂, 裂片钝三角形; 花冠淡黄色, 花冠管长约 7 毫米, 顶端 4 裂微呈二唇形, 上唇凹入, 下唇 3 裂, 裂片椭圆形, 中间裂片长 1.5—2 毫米, 两侧裂片较短, 管内喉部有白色长柔毛; 雄蕊 4, 2 长 2 短; 花药肾形, 棕色; 子房无毛, 顶端密生褐色腺点。核果倒卵球形, 有褐色腺点, 熟时暗红色, 直径约 4 毫米。花果期 5—10 月。

产广东。生山地、山坡林缘。模式

标本采自广东乳源。

全株可作牲畜药, 能消肿止痛、消积杀虫、祛寒痰和寒湿(《广东中兽医常用草药》)。

本种与长序豆腐柴 *P. fordii* Dunn 近似, 但后者全体密生长柔毛, 花萼及花冠在花后均被茸毛等性状可以区别。

6. 黄药 (中国高等植物图鉴)

Premna cavaleriei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 439. 1912; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 87. 1932; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 324. 1934; 中国高等植物图鉴 3: 591. 图 5135. 1974; — *Clerodendrum elachistanthum* Merr. ex Li in Journ. Arn. Arb. 25: 426. 1944, syn. nov.

小乔木至乔木, 高 4—9 米; 树皮暗灰色, 小枝圆柱形, 幼时赤褐色, 密生短绒毛, 老后变无毛, 有细小椭圆形皮孔。叶片薄纸质, 卵形或卵状长椭圆形, 长 9—15 厘米, 宽 (3.5)—5—9 厘米, 同对叶常不同形, 全缘, 顶端渐尖至钝, 基部阔楔形、圆形、截平或近心脏形, 两面疏生茸毛或近无毛, 背面有不明显的腺点; 叶柄疏被茸毛或近无毛, 长 2—5 厘