

米,同对叶柄常不等长。圆锥状聚伞花序顶生,密生茸毛,有疏散开展的分枝,长11—32厘米,宽8—15厘米;花萼钟状,长1—2.5毫米,外面密生茸毛和不明显的腺点,顶端5裂,略呈二唇形,裂齿钝三角形;花冠淡黄色,4裂近二唇形,裂片向外开展,外面疏生茸毛和密生腺点,花冠管长2—3毫米,喉部密生长柔毛;雄蕊4,2长2短;子房无毛,顶端密生黄色腺点。核果卵球形,径约2毫米。 花果期5—7月。

产江西(井冈山)、湖南(江永县、云峰山区、黔阳县)、广东、广西、贵州。生于海拔约800米的山坡及路边疏林中。模式标本采自贵州平坝。

7. 尖叶豆腐柴 (云南植物志)

Premna chevalieri P. Dop. in Bull. Soc. Bot. France 70: 445. 1923 et in Lecomte, Fl. Gén. L'Indo-Chine 4: 813. f. 87, 6. 1935, excl. syn. *Premna acuminatissima* Merr. (1930) et P'ei (1932); 云南植物志 1: 421. 图版 100, 5—7. 1977. —*Premna acuminatissima* Merr. in Univ. Calif. Publ. 10: 430. 1924, non Merr. in Lingn. Sci. Journ. 6: 284. 1930.

灌木至乔木,高2—5米;小枝圆柱形,嫩枝明显被微柔毛,老时变无毛,棕褐色,有条纹。叶片坚纸质至近革质,有光泽,卵形或椭圆状卵形,长5—9厘米,宽3—4—(5)厘米,同对叶片常不同大小,顶端渐尖或尾尖,基部楔形或圆形,常不对称,两面无毛或背面被稀疏微柔毛,全缘或在基部有不明显的细锯齿,侧脉4—5对,近基部3出,在两面均明显隆起;叶柄纤细,被毛,长(1)—2.5—3厘米,同对叶柄常不等长。顶生圆锥花序疏散,被微柔毛,长达25厘米,宽达10厘米,基部苞片叶状,上部小苞片线形,被毛;花柄长约1毫米;花由黄变白色,有紫色斑点;花萼长约1毫米,5浅裂,略呈二唇形,裂片近三角形,有腺点;花冠长约5毫米,外面被腺点和短毛,二唇形,上唇圆形,全缘,下唇3浅裂,裂片圆形,喉部被毛;雄蕊4,2长2短,着生于花冠管中部,与花冠等长;花药近球形,个字着生;子房无毛,有腺点;花柱长约5毫米,有稀疏腺点,柱头2浅裂。核果黑色,直径约(4.5)—5毫米,果萼增大1倍。

产广东海南岛与云南东南部。生于海拔800—1100米的山坡、路旁疏林中。越南北方、老挝也有分布。

本种同对叶片不同大小,且叶柄不等长似黄药 *P. cavaleriei* Lévl., 但黄药的叶片薄纸质,花萼密生茸毛;核果直径约2毫米,仅顶部有腺点等性状可以区别。

8. 滇桂豆腐柴 (云南植物志) 图版 10: 1—4

Premna confinis P'ei et S. L. Chen ex C. Y. Wu, 云南植物志 1: 437. 图版 104, 1—2. 1977.

常绿灌木至小乔木,高1.5—6米;小枝圆柱形,栗褐色,密被糠枇状腺点,无毛,较密被点状至线形皮孔。叶片革质,长圆形至披针形,稀椭圆形,长9—16厘米,宽3.5—8厘米,顶端急尖至短渐尖,基部楔形略下延,全缘或波状,干时表面带暗褐色,无毛,背面较