

药用植物名录》)。



图 55 麻叶豆腐柴 *Premna urticifolia*
Rehd. (史渭清绘)



图 56 草坡豆腐柴 *Premna steppicola*
Hand.-Mazz. (陈荣道绘)

24. 小叶豆腐柴 (云南植物志)

Premna parviliba P'ei in Mem. Sci. Soc. China 3 (2): 62. 1932; 云南植物志 1: 428. 1977. — *Celastrus yunnanensis* Lévl. Cat. Pl. Yunnan, 32. 1915, non est *Premna yunnanensis* W. W. Sm., nec P. Dop.

灌木; 幼枝纤细, 脆弱, 密被柔毛。叶片纸质, 披针形或卵状披针形, 长 0.5—3.8 厘米, 宽 0.3—1.1 厘米, 顶端钝, 基部圆形, 边缘上部有少数锯齿, 两面被散生柔毛, 侧脉 3—4 对, 在表面下陷, 背面隆起; 叶柄长 2—6 毫米, 圆柱形, 密被柔毛。圆锥状伞房花序小, 直径不超过 2.5 厘米, 有少数至 25 朵花, 被柔毛和腺点; 苞片披针形, 长约 4 毫米; 花序梗长约 5 毫米, 花柄长约 2 毫米; 花萼 5 齿, 萼管长约 2 毫米, 外面被柔毛和腺点, 内面被腺点和少数毛; 花冠粉红色, 长约 6 毫米, 二唇形, 下唇凹, 外面被毛, 有腺点, 喉部被疏柔毛; 雄蕊略伸出花冠; 花柱无毛, 柱头短 2 裂, 有 1 或少数腺点; 子房顶部有少数毛和腺点。

特产云南金沙江河谷。生于海拔 400 米岩石上。

25. 草坡豆腐柴 (云南植物志) 图 56

Premna steppicola Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 902. 1936; 云南植物志 1: 430.