

药用植物名录》)。



图 55 麻叶豆腐柴 *Premna urticifolia*
Rehd. (史渭清绘)



图 56 草坡豆腐柴 *Premna stepicola*
Hand.-Mazz. (陈荣道绘)

24. 小叶豆腐柴 (云南植物志)

Premna parviliba P'ei in Mem. Sci. Soc. China 3 (2): 62. 1932; 云南植物志 1: 428. 1977. — *Celastrus yunnanensis* Lévl. Cat. Pl. Yunnan, 32. 1915, non est *Premna yunnanensis* W. W. Sm., nec P. Dop.

灌木; 幼枝纤细, 脆弱, 密被柔毛。叶片纸质, 披针形或卵状披针形, 长 0.5—3.8 厘米, 宽 0.3—1.1 厘米, 顶端钝, 基部圆形, 边缘上部有少数锯齿, 两面被散生柔毛, 侧脉 3—4 对, 在表面下陷, 背面隆起; 叶柄长 2—6 毫米, 圆柱形, 密被柔毛。圆锥状伞房花序小, 直径不超过 2.5 厘米, 有少数至 25 朵花, 被柔毛和腺点; 苞片披针形, 长约 4 毫米; 花序梗长约 5 毫米, 花柄长约 2 毫米; 花萼 5 齿, 萼管长约 2 毫米, 外面被柔毛和腺点, 内面被腺点和少数毛; 花冠粉红色, 长约 6 毫米, 二唇形, 下唇凹, 外面被毛, 有腺点, 喉部被疏柔毛; 雄蕊略伸出花冠; 花柱无毛, 柱头短 2 裂, 有 1 或少数腺点; 子房顶部有少数毛和腺点。

特产云南金沙江河谷。生于海拔 400 米岩石上。

25. 草坡豆腐柴 (云南植物志) 图 56

Premna stepicola Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 902. 1936; 云南植物志 1: 430.

1977.

灌木;小枝纤细,密被微柔毛,老时变无毛,带灰色。叶片阔卵形,长1.5—3.5厘米,宽1.2—2厘米,顶端渐尖,基部阔圆形,边缘除叶基部外,略有少数短而宽,稀不明显的牙齿,表面散生微硬毛及细小腺点,背面沿中脉及侧脉、细脉密生小疏柔毛,侧脉3—4对,隆起;叶柄长4—5毫米,密被贴生微柔毛。花约12朵在枝顶密集成头状,花序直径1.5—2厘米,密被微柔毛;苞片及小苞片线形,密被白色平展疏柔毛;花萼钟状,长3—4毫米,5深裂达下部1/3处,裂片披针形,与花冠均密被腺点和散生微硬毛;花冠长达6毫米,上唇凹,下唇3裂,喉部密被髯毛;雄蕊4,近等长,近内藏;子房顶端被小腺点。核果径约2.5毫米,紫黑色。果期10月。

产四川西南部、云南西北部的金沙江河谷一带。生于海拔1400—1500米的草坡中。模式标本采自云南华坪与新庄之间。

本种近似小叶豆腐柴 *P. parvilimba* P'ei, 但后者叶为披针形或卵状披针形,苞片披针形,雄蕊略伸出花冠外等性状可以区别。

26. 少花豆腐柴 (云南植物志)

Premna oligantha C. Y. Wu, 云南植物志 1: 434. 图版 103, 1—3. 1977.

小灌木,高约30—100厘米,多分枝;当年生枝短小,密被微柔毛,小枝灰白色,变无毛,老枝暗灰色,疏生暗色条纹,皮撕裂状。叶片纸质,卵状披针形、卵圆形至近圆形,长(0.3)—1—1.5厘米,宽(2.5)—5—6毫米,顶端钝,基部楔形至近圆形,全缘或中部有(1)—2—3—(6)对波状锯齿,表面黑绿色,疏被小伏刺毛及黄色腺点,背面暗绿色,仅沿脉有微柔毛,密被黄色腺点,侧脉2—3对,在表面下陷,背面明显隆起,细脉可见;叶柄纤细,长1—2毫米,被微柔毛。伞房花序顶生,总花梗极短,有花2—4—(6)朵;小苞片线形;花柄长1—2毫米,被毛;花萼长约5毫米,5裂达中部,裂片三角状披针形,被毛和黄色腺点;花冠淡紫色,长约6毫米,管部无毛,喉部有数柔毛,4裂成二唇形,上唇圆形,下唇3浅裂,近圆形,裂片外密被微毛和黄色腺点;雄蕊4,2长2短,略伸出花冠外,花药个字着生,2室,纵裂;子房黑褐色,长约1.5毫米,倒卵形,无毛,顶端有腺点,花柱纤细,疏被毛。核果黑色。花果期6—10月。

产四川、西藏东南部与云南西北部。生于海拔2120—3200米的江边干砂坡上。模式标本采自西藏察瓦龙。

27. 尖齿豆腐柴 (云南植物志) 尖叶臭黄荆(中国高等植物图鉴)

Premna acutata W. W. Sm. in Notes Bot. Gard. Endinb. 9: 119. 1916; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 63. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 903. 1936; 中国高等植物图鉴 3: 591. 图 5136. 1974; 云南植物志 1: 434. 1977.

灌木,高1—4米;幼枝被污黄色毡状柔毛,老枝淡褐色,变无毛,散生皮孔。叶片卵形或卵状披针形,同对叶可不同大小,长4—8厘米,宽2—4厘米,顶端渐尖至尾状渐尖,基