

披针形, 较小, 基部圆形; 花萼 5 等裂至中部以下等性状有区别。

31. 圆叶豆腐柴 (云南植物志)

Premna tenii P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 66. Pl. 11. 1932; 云南植物志 1: 430. 1977.——*Premna rotundifolia* P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 59. in clavi.

灌木; 分枝、小枝、叶片和花序均密被短柔毛。叶片膜质, 阔卵形至近圆形, 密被短柔毛和稀疏的腺点, 边缘有圆锯齿至近全缘或波状, 顶端圆至钝, 基部圆或楔形, 长 2—8 厘米, 宽 0.9—5.7 厘米, 侧脉 3—6; 叶柄长约 0.3 厘米, 密被卷曲柔毛。花序在枝顶紧密成头状, 几无梗或有长约 0.3 厘米的花序梗; 花萼深 5 等裂, 两面有长柔毛和稀疏腺点, 裂片有 1 脉, 长约 6 毫米; 花冠长约 7 毫米, 外面有长柔毛, 内面散生腺点, 喉部有长柔毛; 雄蕊稍外露, 花丝光滑; 花柱光滑; 子房有腺点, 顶端有少数毛。

产云南大姚。

本种近似尖齿豆腐柴 *P. acutata* W. W. Sm., 但后者叶片卵形或卵状披针形, 边缘疏生规则或不规则的尖齿可以区别。

32. 近头状豆腐柴 (云南植物志) 头序臭黄荆 (中国高等植物图鉴)

Premna subcapitata Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 458. 1917; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 227. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 68. pl. 13. 1932; 中国高等植物图鉴 3: 592. 图 5138. 1974; 云南植物志 1: 431. 1977.——*Premna pilosa* P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 66. 1932.

灌木, 高 1—2 米; 枝条暗褐色或灰褐色, 有明显圆形或椭圆形黄白色腺状皮孔, 嫩枝有黄白色平展绒毛, 老枝可近无毛。叶片卵形至卵状长圆形, 长 2.5—8.5 厘米, 宽 1.5—4.8 厘米, 边缘除顶端与基部外, 多少有锯齿, 顶端渐尖或急尖, 基部截形或圆形, 表面暗黄绿色, 有柔毛与黄色腺点, 背面有毡状毛和腺点, 或老时毛较疏; 叶柄圆柱形, 长 0.4—1 厘米 (同对叶柄常不等长), 有平展柔毛。聚伞花序在小枝顶端紧缩成头状, 长 0.6—2.5 厘米, 宽 1—3.5 厘米; 花序梗圆柱形, 长 0.5—2 厘米; 苞片小, 线形或狭披针形, 长 0.5—1 厘米; 花萼杯状, 长约 4 毫米 (结果时增大), 两面被毛和淡黄色腺点, 分裂达中部, 裂片披针形或狭长三角形, 长约 2 毫米, 宽约 1 毫米; 花冠黄绿或绿白色, 长约 6 毫米, 外被柔毛和腺点, 4 裂成二唇形, 裂片卵状圆形, 上唇全缘, 下唇 3 裂, 花冠管长约 3 毫米, 喉部密生一圈长柔毛; 雄蕊 4, 稍伸出花冠外; 子房顶端疏生有毛和密生淡黄色腺点; 花柱长约 6 毫米。核果暗黑色, 卵形, 长 3—4 毫米, 宽 2—3 毫米, 顶端疏生有毛和淡黄色腺点。花果期 5—8 月。

产四川西南部与云南东北部。生于海拔约 2600 米的山坡林中。模式标本采自四川峨眉山。

本种近似云南豆腐柴 *P. yunnanensis* W. W. Sm., 但后者花萼深裂达中部以下,