

无毛,上部有黄色腺点。核果圆形至倒卵形,紫黑色,长5—7毫米,宽4—5毫米。花果期6—9月。

产云南南部。生于海拔500—1500米比较干燥的疏林中。模式标本采自云南思茅。

根皮及茎皮入药,有止血、镇痛、消炎之效;治外伤出血、跌打、骨折及风湿骨痛(《云南植物志》)。

35. 百色豆腐柴 图版 12

Premna paisiensis P'ei et S. L. Chen in Addenda.

乔木,高约13米,树皮灰色;老枝无毛,褐色,有纵纹,嫩枝绿色,有柔毛。叶片近膜质,长椭圆形,长9—15厘米,宽3—6.5厘米,顶端短渐尖或急尖,基部阔楔形或钝,边缘近全缘或有不规则的波状,表面绿色,被脱落性小糙毛,背面淡绿色,密被黄褐色绒毛,有淡黄色腺点,侧脉5—6对,与主脉约成30度的角,主脉及侧脉在背面甚突起。在表面亦明晰可见。聚伞花序在枝顶组成伞房状,疏松开展,分枝二歧分出,结果时高12—15厘米,宽10—22厘米,有长4—6厘米的花序梗,均被黄褐色短柔毛;苞片线形,长2—9毫米;花萼至结果时几截平,外被腺点和稀疏的柔毛。果实圆球形或倒卵球形,长5—6毫米,宽4—5毫米,有腺点和细毛,成熟时紫色。果期7—8月。

特产广西百色。生于海拔约1000米的山地林中。

本种为高大乔木,花序开展似思茅豆腐柴 *P. szemaoensis* P'ei, 但花序无明显的主轴,叶片为长椭圆形,宽3—6.5厘米等性状可以区别。

36. 腾冲豆腐柴 (云南植物志)

Premna scoriarum W. W. Sm. in Notes Bot. Gard. Edinb. 12: 219. 1920; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 70. 1932; 云南植物志 1: 436. 1977.

乔木或灌木,高达20米,胸径28厘米;当年小枝粗壮,圆柱形,带黑色,疏生线形皮孔,老时转灰褐色。叶片坚纸质,卵圆形至卵状披针形或近椭圆形,长10—15—(21)厘米,宽5—9—(10)厘米,顶端渐尖,基部近圆形,全缘或有时微波状,两面无毛,表面深绿色,干时带黑色,光亮,背面稍淡,侧脉6—7对,近基部2—3对稍密集,多分枝,弧状上升,在表面与主脉微下陷,背面扁平隆起,细脉近平行,与网脉均在两面微隆起;叶柄长1.5—3.5厘米。伞房状聚伞花序顶生,疏散,长8—10厘米(包括花序梗),宽达14厘米;花序梗长约3厘米,扁平,分枝3—5对,扁平,较开展,疏生微柔毛,每枝4回二歧分枝;苞片线状披针形,长约5毫米,被疏柔毛;花萼长约1毫米,钟形,外面疏被微柔毛,近中部4裂,裂齿近等长,裂片长圆形,顶端钝;雄蕊4。幼果暗绿色,长圆状倒卵形,长2.5—3—(4)毫米,核平滑;宿萼近盘状。花期5月,果期6月以后。

产云南西部。生于海拔1300—1660米的沼地密林中。缅甸也有分布。模式标本采自云南腾冲。

37. 藤豆腐柴 (云南植物志)