

- 毛.....12. 滇牡荆 *V. yunnanensis* W. W. Sm.
 21. 聚伞花序长 6 厘米以上。
 23. 小叶 3—5, 中间的小叶长 7—17 厘米, 宽 2.5—8 厘米; 花序梗密生短柔毛.....
 13. 长叶荆 *V. lanceifolia* S. C. Huang
 23. 小叶 5, 中间的小叶长 5—7 厘米, 宽约 2 厘米; 花序梗近无毛或被极稀疏的短柔毛
 14. 金沙荆 *V. duclouxii* P. Dop

组 1. 顶序组——Sect. *Vitex*——Sect. *Terminales* P. Dop in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 57: 197. 1928.

花序顶生。

我国有 9 种, 7 变种, 2 变型; 主要分布黄河流域以南各省。

1. 广西牡荆 (拉汉种子植物名称) 图 66

Vitex kwangsiensis P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 93. pl. 20. 1932;
 Moldenke in Phytologia 8: 42. 1961.

乔木; 小枝四棱形, 无毛, 青灰色, 干后不呈紫黑色, 皮孔不显著。掌状复叶, 叶柄长 2—7 厘米, 小叶 2—5, 通常 3, 中间的小叶片卵形至卵状披针形, 长 4.5—14 厘米, 宽 2.5—5 厘米, 全缘, 顶端渐尖或尾状尖, 基部宽楔形至楔形, 表面绿色, 有光泽, 脉上稍有毛, 沿主脉的毛较明显, 背面青绿色、无毛, 有金黄色腺点, 小叶柄长 1—1.5 厘米; 两侧小叶较小。圆锥状聚伞花序顶生, 长 6—10 厘米, 花序梗近无毛; 花萼钟状, 长约 2.5 毫米, 顶端有 5 齿, 外面无毛而有腺点; 花冠橙黄色, 花冠管长 3.5—6 毫米, 顶端 5 裂, 二唇形, 下唇中间裂片较大, 外面被微毛和腺点; 雄蕊着生在花冠管的下部, 伸出花冠外, 花丝下半部有毛; 子房无毛, 顶端有金黄色腺点; 花柱无毛, 柱头 2 裂。核果球形。花期 5—6 月, 果期 7—9 月。



图 66 广西牡荆 *Vitex Kwangsiensis* P'ei (陈荣道绘)

产广西 (龙州、宁明)。生于海拔 300—550 米的山坡疏林荫处。模式标本采自广西龙州。

2. 越南牡荆 (海南植物志)