

9d. 白毛黄荆 (新拟) 白叶黄荆(云南植物志) 图 72

f. *alba* P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 104. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 906. 1936; Moldenke in Phytologia 8: 66. 1961. 云南植物志 1: 451. 1977.

灌木;小枝密生灰白色绒毛。小叶通常3,罕有5;小叶片阔披针形至卵形,全缘或偶有少数锯齿,两面密生灰白色绒毛。花序较紧缩。

产四川、云南。生于海拔1200—2500米的溪边、山坡或灌木丛中。模式标本采自云南。



图 72 白毛黄荆 *Vitex negundo* Linn.
f. *alba* P'ei (史渭清绘)

9e. 拟黄荆 (新拟) 图版 16

var. *thyrsoides* P'ei et S. L. Liou in Addenda.

本变种主要特点:掌状复叶,小叶3—5;小叶片披针形或狭椭圆形,全缘,表面疏生柔毛或在脉上有毛,背面密生灰白色绒毛。圆锥花序由假聚伞花序组成,最末侧枝上的花常呈总状排列。花果期8—10月。

产四川、广东。生于海拔300—2100米的山坡林中。模式标本采自四川城口。

9f. 牡荆 (名医别录)

var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gotoburg. 9: 67. 1934; Moldenke in Phytologia 8: 67. 1961.—*Vitex cannabifolia* Sieb.