

2—6 厘米。聚伞花序排列成狭长圆锥状,顶生,下垂,花序梗纤细;苞片线形或披针形,近花序基部的呈叶状,果时脱落;花萼钟状,长 7—9 毫米,无毛或疏生细毛,5 深裂,裂片长圆形或椭圆形,长 4—6 毫米;花冠淡黄绿色或白色,外被细毛和腺点(有时不明显),花冠管长 1.5—1.8 厘米,花冠裂片匙形,长约 8 毫米;雄蕊与花柱同伸出花冠外。核果球形,绿色,成熟后宿萼增大,红色,向外反折。 花果期 8—12 月。

产云南南部、广西百色。生于海拔 400—1500—(2400) 米的山坡沟谷或密林下。模式标本采自云南思茅。越南也有分布。

本种与垂茉莉 *Cl. wallichii* Merr. 相近,但后者小枝、花序轴四棱形或具翅,叶片近革质,长圆状披针形或披针形,叶柄短等特征可以区别。亦与南垂茉莉 *Cl. henryi* P'ei 相近,但后者叶干后通常变黑;花序主轴较紧缩成短圆锥状聚伞花序;小枝髓部一般干后中空等特征,可以区别。

10. 黄腺大青 (新拟) 图版 17

Clerodendrum luteopunctatum P'ei et S. L. Chen in Addenda.

灌木,高 2—4 米;幼枝及花序轴密被锈色短绒毛,小枝具椭圆形乳黄色皮孔。叶片纸质,长圆状披针形,长 7—15 厘米,宽 2.5—5 厘米,顶端长渐尖或尾尖,基部宽楔形或圆形,偶有歪斜,两面疏被短柔毛,沿脉密,并密生黄色腺点,全缘,叶缘密生睫毛,侧脉 4—7 对,在背面凸起;叶柄长 1—5 厘米,密被短绒毛。聚伞花序组成伞房状或短圆锥状,顶生或生于枝顶叶腋;苞片与花萼呈紫色,披针形或狭披针形,长 1—1.5 厘米,宽 2—4 毫米,顶端长渐尖,两面都被黄色腺点;花萼钟状,近膜质,长约 1.3 厘米,两面都具腺点,顶端 5 深裂,裂片狭长三角形或披针形,长约 9 毫米;花冠白色,花冠管长 2—2.5 厘米,顶端 5 裂,裂片长圆形,长约 5 毫米;雄蕊 4,稍伸出花冠;花柱与雄蕊近等长或稍短,柱头 2 裂;子房无毛。果实近球形,径约 6 毫米,包藏于紫红色的花萼中。 花果期 6—10 月。

产湖北、四川、贵州。生于海拔 625—1150 米的山坡路旁或灌木林中。模式标本采自四川城口。

11. 狗牙大青 (新拟) 假狗牙花(云南植物志) 图 84

Clerodendrum ervatamioides C. Y. Wu, 云南植物志 1: 460. 图版 109, 5—6. 1977.

灌木或藤状灌木,高 0.8—3 米;小枝略四棱形,干后有沟槽,老枝近圆柱形,淡灰褐色或褐色,细弱,密被短伏毛或几无毛,散生皮孔,髓心小,疏松,有淡黄色薄片状横隔。叶片近革质,椭圆形或长圆形,长 5.5—12.5 厘米,宽 2.3—4.5 厘米,顶端尾状渐尖,基部宽楔形,稀近圆形,全缘或呈微波状,略反卷,表面几无毛,密被细小腺点或为腺窝,背面隆起;叶柄长 0.5—1.6 厘米,上面具深沟,背部隆起,密被短伏毛。聚伞花序组成短缩的近乎头状的圆锥花序,直立,着生在小枝或侧枝的顶端,长约 5.5 厘米,花序梗长约 7 毫米,和花柄密被短伏毛;苞片线形,长 4—7 毫米,顶端外卷,密被短伏毛;花萼红色,钟状,长 1—



黄腺大青 *Clerodendrum luteopunctatum* P'ei et S.L. Chen: 1. 部分植株, 2. 苞片和花萼,
3. 叶背部分放大示黄色腺点, 4. 花, 5. 果萼和果。(蒋杏墙绘)

fructu in tubo calycis incluso differt.

四川：普格，洛乌沟区，海拔 3000 米，山坡林缘，四川药源普查队 25237（模式标本 *Typus*，存江苏省植物研究所），1960 年 8 月 8 日；宁南，城关二管区，海拔 1200 米，山坡沟边，四川省生物研究所 614137。

17. *Vitex* Linn.

Sect. 1. *Vitex*

5b. *Vitex quinata* (Lour.) Will. f. *lungchowensis* S. L. Liou, f. nov.

A typo differt fructo dense puberulo.

广西：龙州，生于海拔 500 米的丘陵、山顶密林中。陈少卿 13667（模式标本 *Typus*，存广西植物研究所）

9e. *Vitex negundo* Linn. var. *thyrsoides* P'ei et S. L. Liou, var. nov.

A typo recedit panicula pseudocymas composita.

四川：城口，1958 年 10 月 15 日，戴天伦 104763（模式标本 *Typus*，存江苏省植物研究所）。

18. *Clerodendrum* Linn.

Sect. 1. *Clerodendrum*

Ser. 2. *Penduliflora* Schauer

10. *Clerodendrum luteopunctatum* P'ei et S. L. Chen, sp. nov.

Proximum *Cl. griffithiano* C. B. Clarke, sed ramulis et axibus inflorescentiae dense ferrugineso-tomentosis, foliis utrinque dense fulvo-glandulosis, inflorescentia compacta corymbosa multiflora differt.

湖北：利川，生于河岸林中，戴伦膺和钱重海 825（模式标本 *Typus*，存中国科学院植物研究所）

四川：城口，戴天伦 103043。

贵州：德江，黔北队 2739。

12b. *Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz. var. *kwangsiense* S. L. Chen et T. D. Zhuang, var. nov.

A typo differt foliis oblongis apice obtusis margine rotundoserratis petiolis robustis; ramulis inflorescentiae brevioribus.

广西：贵县，钟树权 62476（模式标本 *Typus*，存广西植物研究所）。

Ser. 4. *Subscaposa* P'ei et S. L. Chen, ser. nov.

Inflorescentiae paniculato-cymosae pyramidatae, ramis oppositis vel