

泰国、老挝、越南、马来西亚和印度尼西亚也有分布。




图 97 绢毛大青 *Clerodendrum villosum*
Blume (史渭清绘)

28. 江西大青 (新拟)

Clerodendrum kiangsiense Merr. ex H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 426. 1944.

灌木，高 2—3 米；幼枝密被褐色短柔毛，皮孔不显，髓充实。叶片纸质，椭圆状卵形或椭圆形，长 5—13 厘米，宽 3—9 厘米，顶端渐尖或短尾尖，基部宽圆形或近截形，全缘或偶见有很稀疏不明显的细齿，两面多少被短柔毛，背面密生腺点，侧脉 4—6 对，在表面略显著；叶柄长 2—4.5 厘米，被短柔毛。伞房状聚伞花序疏展，主轴长 3—5.5 厘米，花序宽 7—15 厘米；苞片叶状，长圆形，长 8—10 毫米，宽 3—4 毫米，被短柔毛及散生腺点；花萼钟状，外面被短柔毛和腺点，长约 6 毫米，顶端 5 裂，裂片狭三角形；花冠淡红色，花冠管纤细，长 7—10 毫米，宽约 1 毫米，外面散生短柔毛，顶端 5 裂，裂片长圆形，长约 6 毫米；雄蕊 4，与花柱同伸出花冠外；花柱较雄蕊长，柱头 2 裂，顶端急尖。果实绿色，近球形，为宿萼所托。花果期 6—10 月。

产浙江、江西。生于低海拔的树林中。模式标本采自江西南部。

本种近于大青 *Cl. cyrtophyllum* Turcz.，但后者苞片线形，花序较疏展，叶背面一般无毛和无腺点。