

29. **海通** (中国药用植物志) 满大青(云南植物志), 小花泡桐、牡丹树、泡桐树(云南), 白灯笼、木常山(广西), 桐木树、朴瓜树、线桐树、鞋头树(湖南), 臭梧桐(江西), 铁枪桐(贵州)

Clerodendrum mandarinorum Diels in Bot. Jahrb. 29: 549. 1900; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 375. 1916; P'ei in Sinensia 2: 75. 1931, et in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 145. 1932; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 325. 1934; P. Dop in Lecomte, Fl. Gen. L'Indo-Chine 4: 875. 1935; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 908. 1936; P'ei in Bot. Bull. Acad. Sinica 1: 6. 1947; 裴鉴、周太炎, 中国药用植物志 3: 图 132. 1953; 中国高等植物图鉴 3: 603. 图 5157. 1974; 云南植物志 1: 477. 图版 114, 1—4. 1977.——*Clerodendron bodinierii* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 9: 325. 1911.——*Clerodendron cavaleriei* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 10: 439. 1912.——*Clerodendrum bodinierii* Lévl. var. *cavalerie* Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 441. 1915.——*Clerodendron tsaii* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 315. 1944.——*Clerodendron kwangtungense* Hand.-Mazz. var. *puberulum* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 426. 1944.

灌木或乔木, 高 2—20 米, 幼枝略呈四棱形, 密被黄褐色绒毛, 髓具明显的黄色薄片状横隔。叶片近革质, 卵状椭圆形、卵形、宽卵形至心形, 长 10—27 厘米, 宽 6—20 厘米, 顶端渐尖, 基部截形、近心形或稍偏斜, 表面绿色, 被短柔毛, 背面密被灰白色绒毛。伞房状聚伞花序顶生, 分枝多, 疏散, 花序梗以至花柄都密被黄褐色绒毛; 苞片长 4—5 毫米, 易脱落, 小苞片线形, 长约 3 毫米; 花萼小, 钟状, 长 3—4 毫米, 密被短柔毛和少数盘状腺体, 萼齿尖细, 钻形, 长 1.5—2.5 毫米; 花冠白色或偶为淡紫色, 有香气, 外被短柔毛, 花冠管纤细, 长 7—10 毫米, 裂片长圆形, 长约 3.5 毫米; 雄蕊及花柱伸出花冠外。核果近球形, 幼时绿色, 成熟后蓝黑色, 干后果皮常皱成网状, 宿萼增大, 红色, 包果一半以上。 花果期 7—12 月。

产江西、湖南、湖北、广东、广西、四川、云南、贵州。生于海拔 250—2200 米的溪边、路旁或丛林中。模式标本采自四川南川。越南北部也有分布。

四川、广西民间用其枝叶治半边疯。

本种的花常为虫或菌所袭, 使花冠增大、增厚、色泽加深。

30. **短蕊大青** (新拟) 短蕊茉莉(云南植物志) 图 98

Clerodendrum brachystemon C. Y. Wu et R. C. Fang, 云南植物志 1: 475. 图版 113, 3—4. 1977.

灌木, 高 4 米; 小枝近四棱形, 密被黄褐色绒毛和腺点。叶片卵形, 长 10—20 厘米, 宽 5—10 厘米, 顶端渐尖或长渐尖, 基部截形或圆形, 全缘, 表面密被短柔毛和腺点, 背面密被黄褐色绒毛和腺点; 叶柄长 2.5—8 厘米, 密被黄褐色绒毛和腺点。聚伞花序成对着生