

组 2. 穗花香科科组——Sect. *Stachyobotrys* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 672. 1835; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:213. 1897, p. p.; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:292. 1929, p. p.; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):330. 1965——Sect. *Pycnobotrys* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 671. 1836, p. p.——Sect. *Scorodonia* Benth. l. c. 674. 1836, p. p.

轮伞花序具 2—4 花, 于茎及分枝上部组成假穗状花序; 花萼稍呈二唇形, 喉部内无睫毛; 花冠后方弯缺宽阔; 雄蕊伸出; 花盘微 4 裂; 小坚果无网纹。

3. 裂苞香科科 图版 4:9—14

Teucrium veronicoides Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. **23**:388. 1877, Mém. Biol. Bull. Acad. St. Pétersb. **9**:826. 1877; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:291. 1929; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):330. pl. I. XVII. f. 9—14. 1965.

多年生草本, 具匍匐茎。茎直立, 多分枝, 高 20—40 厘米, 被平展长柔毛。叶柄长 1—2 厘米, 被平展长柔毛; 茎中部叶片正圆形至卵圆状正三角形, 长 2—4 厘米, 宽 1.8—3 厘米, 茎下部及分枝上的叶甚小, 有时近肾形, 长 0.7—1.3 厘米, 宽 0.5—1.5 厘米, 先端钝或急尖, 基部平截或近心形, 边缘具重圆齿, 上面被平贴的长柔毛, 下面除脉上被长柔毛外, 余部被短柔毛。轮伞花序 2 花, 在主茎及分枝的上部组成疏生长 5—10 厘米的假穗状花序; 苞片卵圆形, 常 3 裂, 与序轴及花梗均被长柔毛; 花梗长 2.5—3.5 毫米。花萼钟形, 长 3—4 毫米, 宽 2—2.5 毫米, 中部略膨大, 萼齿 5, 正三角形, 几等大, 先端钝, 除边缘具睫毛外几无毛。花冠紫红色, 长 7—8 毫米, 外面近无毛, 唇片舌状伸出, 中裂片近圆形, 侧裂片卵圆状斜三角形, 几等大。雄蕊稍伸出。花盘浅盘状, 微 4 裂。小坚果栗棕色, 长圆状倒卵形, 长 1.2 毫米, 光滑, 无网纹, 合生面超过果长 2/3。花期 7 月。

产辽宁, 湖南, 四川, 云南; 生于山地林下, 海拔 1800—2500 米。朝鲜, 日本也有。模式标本采自日本。

4. 血见愁(岭南采药录) 山藿香(四川峨眉、广东、福建、广西), 肺形草、布地锦(福建), 皱面草、方枝苦草、方骨苦草、野薄荷(广东), 贼子草、假紫苏(广东海南), 野苏麻、蛇药(云南红河), 水苏麻、山黄荆、四棱香(四川叙永), 冲天泡(湖南临武)

Teucrium viscidum Bl. Bijdr. 827. 1825; Merr. Enum. Philipp. Fl. Pl. 409. 1922; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:295; Mukerj. in Rec. Bot. Surv. Ind. **14**(1):218. 1940; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):330, pl.

