

组 2. 穗花香科科组——Sect. *Stachyobotrys* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 672. 1835; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:213. 1897, p. p.; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:292. 1929, p. p.; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):330. 1965——Sect. *Pycnobotrys* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 671. 1836, p. p.——Sect. *Scorodonia* Benth. l. c. 674. 1836, p. p.

轮伞花序具 2—4 花, 于茎及分枝上部组成假穗状花序; 花萼稍呈二唇形, 喉部内无睫毛; 花冠后方弯缺宽阔; 雄蕊伸出; 花盘微 4 裂; 小坚果无网纹。

3. 裂苞香科科 图版 4:9—14

Teucrium veronicoides Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. **23**:388. 1877, Mém. Biol. Bull. Acad. St. Pétersb. **9**:826. 1877; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:291. 1929; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):330. pl. I. XVII. f. 9—14. 1965.

多年生草本, 具匍匐茎。茎直立, 多分枝, 高 20—40 厘米, 被平展长柔毛。叶柄长 1—2 厘米, 被平展长柔毛; 茎中部叶片正圆形至卵圆状正三角形, 长 2—4 厘米, 宽 1.8—3 厘米, 茎下部及分枝上的叶甚小, 有时近肾形, 长 0.7—1.3 厘米, 宽 0.5—1.5 厘米, 先端钝或急尖, 基部平截或近心形, 边缘具重圆齿, 上面被平贴的长柔毛, 下面除脉上被长柔毛外, 余部被短柔毛。轮伞花序 2 花, 在主茎及分枝的上部组成疏生长 5—10 厘米的假穗状花序; 苞片卵圆形, 常 3 裂, 与序轴及花梗均被长柔毛; 花梗长 2.5—3.5 毫米。花萼钟形, 长 3—4 毫米, 宽 2—2.5 毫米, 中部略膨大, 萼齿 5, 正三角形, 几等大, 先端钝, 除边缘具睫毛外几无毛。花冠紫红色, 长 7—8 毫米, 外面近无毛, 唇片舌状伸出, 中裂片近圆形, 侧裂片卵圆状斜三角形, 几等大。雄蕊稍伸出。花盘浅盘状, 微 4 裂。小坚果栗棕色, 长圆状倒卵形, 长 1.2 毫米, 光滑, 无网纹, 合生面超过果长 2/3。花期 7 月。

产辽宁, 湖南, 四川, 云南; 生于山地林下, 海拔 1800—2500 米。朝鲜, 日本也有。模式标本采自日本。

4. 血见愁(岭南采药录) 山藿香(四川峨眉、广东、福建、广西), 肺形草、布地锦(福建), 皱面草、方枝苦草、方骨苦草、野薄荷(广东), 贼子草、假紫苏(广东海南), 野苏麻、蛇药(云南红河), 水苏麻、山黄荆、四棱香(四川叙永), 冲天泡(湖南临武)

Teucrium viscidum Bl. Bijdr. 827. 1825; Merr. Enum. Philipp. Fl. Pl. 409. 1922; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:295; Mukerj. in Rec. Bot. Surv. Ind. **14**(1):218. 1940; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):330, pl.

LXVII, f. 1—6.1965; Back. & Bakh. f. Fl. Java **2**:618.1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:176, f. 32, a-e. 1969—*Teucrium stoloniferum* Roxb. Hort. Beng. 44.1814, nom. nud.; Fl. Ind. Ed. **2**(3):3.1832, descr.; Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:58.1830, Labiat. Gen. et Sp. 647.1836, in DG. Prodr. **12**:516. 1848, Fl. Hongk. 279.1861; Maxim. in Mém. Biol. Bull. Acad. St. Pétersb. **9**: 825.1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:700.1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:314.1890; Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**:551.1900, p. p.; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **22**:318. 1906; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**:212.1912; Belval in Mus. Heude Notes Bot. Chin. no. **2**:104.1933—*Teucrium stoloniferum* Roxb. α *typicum* Maxim. l. c.; Nakai in Bot. Mag. Tokyo **34**:48.1920; et in ibid. **35**:202.1921—*Teucrium philippinense* Merr. in Philipp. Journ. Sci. Bot. **7**:100.1912—*Teucrium massiliense* auct. non Linn.: Lour. Fl. Cochinch. 362.1790.

4a. 血见愁 (原变种) 图版 4:1—6

var. **viscidum**

多年生草本,具匍匐茎。茎直立,高 30—70 厘米,下部无毛或几近无毛,上部具夹生腺毛的短柔毛。叶柄长 1—3 厘米,近无毛;叶片卵圆形至卵圆状长圆形,长 3—10 厘米,先端急尖或短渐尖,基部圆形、阔楔形至楔形,下延,边缘为带重齿的圆齿,有时数齿间具深刻的齿弯,两面近无毛,或被极稀的微柔毛。假穗状花序生于茎及短枝上部,在茎上者由于下部有短的花枝因而俨如圆锥花序,长 3—7 厘米,密被腺毛,由密集具 2 花的轮伞花序组成;苞片披针形,较开放的花稍短或等长;花梗短,长不及 2 毫米,密被腺长柔毛。花萼小,钟形,长 2.8 毫米,宽 2.2 毫米,外面密被腺长柔毛,内而在齿下被稀疏微柔毛,齿缘具缘毛,10 脉,其中 5 副脉不甚明显,萼齿 5,直伸,近等大,长不及萼筒长的 1/2,上 3 齿卵状三角形,先端钝,下 2 齿三角形,稍锐尖,果时花萼呈圆球形,直径 3 毫米,有时甚小。花冠白色,淡红色或淡紫色,长 6.5—7.5 毫

图版 4: 1—6. 血见愁 (原变种) *Teucrium viscidum* Bl. var. *viscidum*, 1. 植株; 2. 花, 侧面观; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 雌蕊; 5. 花冠纵剖, 内面观; 6. 小坚果, 腹面观。7. 血见愁微毛变种 *Teucrium viscidum* Bl. var. *nepetoides* (Lévl.) C. Y. Wu et S. Chow, 7. 花, 侧面观。8. 血见愁光萼变种 *Teucrium viscidum* Bl. var. *leiocalyx* C. Y. Wu et S. Chow, 8. 花, 侧面观。9—14. 裂苞香科科 *Teucrium veronicoides* Maxim., 9. 植株上部; 10. 花, 侧面观; 11. 花萼纵剖, 内面观; 12. 雌蕊; 13. 花冠纵剖, 内面观; 14. 小坚果, 腹面观。(曾孝濂绘)