

var. longibracteatum G. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4): 332.1965.

这一变种与原变种不同在于植株高大;叶基部圆形或截形;假穗状花序被灰色短柔毛而非腺毛;苞片披针形,长达1厘米;花冠中裂片较大。

产湖南;生于山地林下。模式标本采自湖南长沙岳麓山。

本变种与穗花香科接近,唯花冠及唇片的中裂片虽发达但未达穗花香科的程度,且萼被灰白色短柔毛。

4 e. 大唇变种

var. macrostephanum G. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4): 333.1965.

这一变种介于原变种与长苞变种之间。与原变种的区别在于茎上散生短柔毛,叶柄及叶背均被短柔毛,叶基部楔形,花萼被灰色短柔毛,花冠长约1厘米。与长苞变种区别在于苞片短于8毫米,植株散生短柔毛,而非无毛。

产云南,贵州及广西西部;生于山地上。模式标本采自云南马关坡岗。

5. 穗花香科科 野藿香(松村任三:植物名汇),石蚕(植物大辞典,苏南植物手册),水藿香(四川成都)

Teucrium japonicum Willd. Sp. Pl. **3**:23.1800; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 671. 1836, et in DC. Prodr. **12**:581.1848; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. **2**:113.1865; Franch. et Savat. Enum. Pl. Jap. **1**:381.1875; Maxim. in Mém. Biol. Bull. Acad. St. Pétersb. **9**:824.1877, et in ibid. **11**:808.1883; Nakai, Fl. Kor. **2**:157.1911, et in Bot. Mag. Tokyo **26**:295.1920; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:293.1929; 孙雄才,科学社生物所论文集 **7**:10. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:912.1936; Ohwi, Fl. Jap. 998.1956; 裴鉴,单人骅,苏南植物手册 632.1959; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):333, pl. LXVIII, f. 2-7.1965——*Teucrium virginicum* auct. non Linn.:Thunb. Fl. Jap. 244.1784.

5 a. 穗花香科科 (原变种) 图版 5:2—7

var. japonicum

多年生草本,具匍匐茎。茎不分枝或分枝,高50—80厘米,四棱形,具明显的四槽,平滑无毛,极少于近节处有极疏的长柔毛。叶柄长0.8—1.5厘米;叶片卵圆状长圆形至卵圆状披针形,长5—10厘米,宽1.5—4.5厘米,分枝上者十分变小,先端急尖或短渐尖,基部心形、近心形或平截,边缘为带重齿的锯齿或圆齿,除叶柄及叶下面