

这一变种与原变种不同在于茎具极长的分枝,被小钩毛;叶长圆形而小,在 2.5×1.2 厘米左右,边缘具圆齿;假穗状花序生于分枝上端,长达10厘米;花萼疏被短柔毛。

产甘肃,河南,河北;生于荒地上,海拔460—1200米。模式标本采自甘肃武都。

6. 秦岭香科科

Teucrium tsinlingense C. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):334, pl. LXVIII, f. 9—10. 1965.

6 a. 秦岭香科科(原变种) 图版 5:9—10

var. *tsinlingense*

具匍匐茎的草本。茎直立,分枝或不分枝,高40—80厘米,四棱形,具四槽,基部无毛,中部以上被长达2.5毫米的平展长柔毛。叶柄长0.6—1.5厘米,被长柔毛;叶片卵圆状披针形,长3.5—7厘米,宽1—2.5厘米,先端急尖或渐尖,基部截形或近心形,边缘具锯齿,上面疏被微柔毛,下面脉上被短柔毛,他处近无毛,但散布腺点。假穗状花序生于主茎及上部分枝的顶端,长1.5—4.5厘米,主茎上者由于下部有短的侧生花序因而俨如圆锥花序,均由上下密接的2花的轮伞花序组成;苞片线状披针形,与序轴均被疏柔毛;花梗长2毫米左右,无毛。花萼钟形,外面除萼齿具缘毛外余部无毛而具明亮的腺点,长3.5—4毫米,萼齿5,三角形,几等大。花冠粉红色,长约1.1厘米,冠筒与花萼平齐,唇片发达,中裂片近圆形,侧裂片前对卵圆形,后对先端急尖。雄蕊伸出。子房球形,被泡状毛。小坚果未见。

产陕西;生于地埂湿处,海拔约1200米。模式标本采自陕西洋县。

6 b. 紫萼变种

var. ***porphyreum*** C. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):335. 1965.

这一变种不同在于植物体矮小,花萼沿肋被疏柔毛,紫色。

产甘肃东南部;生于高原上,海拔约1900米。模式标本采自甘肃康县。

7. 长毛香科科 铁马鞭(四川巫溪)

Teucrium pilosum (Pamp.) C. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):335, pl. LXVIII, f. 1. 1965—*Teucrium japonicum* Willd. var. *pilosum* Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. ser. **17**:711. 1910—*Teucrium japonicum* Willd. f. *lanatum* Sun ex C. H. Hu in Act. Phytotax. Sin. **11**(1):36. 1966.

7 a. 长毛香科科(原变种) 图版 5:1