

端渐尖或尾状渐尖,疏被长柔毛。花萼钟形,长4—5毫米,宽2毫米,被长柔毛或短柔毛,萼齿5,呈二唇形,上唇3齿,中齿极发达,倒卵状扁圆形,侧齿三角形,短小,下唇2齿披针形,喉部具一上向的白色睫状毛环。花冠淡红色,长1.2—1.3厘米,外面极疏被短柔毛,散布淡黄色腺点,内面在喉部下方有白色微柔毛,冠筒长为花冠长 $1/3$,稍伸出萼外,唇片几与冠筒成直角,中裂片倒卵状近圆形,长不及唇片长 $1/2$,侧裂片卵状长圆形,后方一对向后弯折。雄蕊稍短于花冠。花柱先端2浅裂。花盘盘状,4浅裂。子房近球形。小坚果倒卵状近圆形,常非4枚同等发育,长约1毫米,暗栗棕色,背面具网纹。花期7—9月。

产福建、湖南、贵州三省南部,江西西部及南部,广东,广西,云南;生于山地阳坡,林下及灌丛中,海拔350—2400米。印度尼西亚的苏门答腊,泰国,缅甸北部,印度,锡金至尼泊尔也有。模式标本采自尼泊尔。

民间用全草治劳伤水肿,根治肚胀、泻痢,叶用于止血,治刀枪伤。

10. 矮生香科科 图版 7:1—6

Teucrium nanum G. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4): 337, pl. LXX, f. 1—6. 1965——*Teucrium simplex* auct. non Vaniot: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:191. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:293. 1929.

多年生草本,植株矮小。茎直立或上升,高20—25厘米,圆柱形,不分枝,被粗糙长柔毛。叶对生或三叶轮生,具短柄,柄长3—5毫米,被长柔毛,向上渐趋无柄;叶片长圆形或倒卵形,长2—4厘米,宽1.2—2厘米,先端圆形或钝,基部楔形下延,边缘在中部以上具圆齿,上面被长柔毛,下面被绒毛。假穗状花序顶生,长6—8厘米,序轴密被长柔毛;苞片长圆状披针形至倒卵状披针形,短于花萼;花梗短,长1.5毫米,密被黄色长柔毛。花萼钟形,长5毫米,宽3.3毫米,外面与苞片均密被黄色长柔毛,内面在喉部具疏柔毛环,二唇形,上唇发达,3齿,中齿特大,扁圆形,先端急尖,侧裂片卵圆状斜三角形,下唇2齿,钻形。花冠全长11—12毫米,外面被疏柔毛,内面被白色微柔毛,冠筒长约为花冠长之半,唇片与花冠筒成直角,中裂片近圆形,具爪,侧裂片卵圆状披针形。雄蕊伸出,花药平叉分,药隔上散见白色泡状毛,花柱先端2浅裂。花盘极小,盘状,全缘。子房圆球形,浅4裂。小坚果椭圆形,稍见网纹,棕色,长约1毫米,合生面超过果长 $1/2$ 。花期8—9月。

产云南西部,四川西南部;生于山坡草地。模式标本采自云南漾濞。

11. 安龙香科科 图版 8:8—13

图版 7

