

端渐尖或尾状渐尖,疏被长柔毛。花萼钟形,长4—5毫米,宽2毫米,被长柔毛或短柔毛,萼齿5,呈二唇形,上唇3齿,中齿极发达,倒卵状扁圆形,侧齿三角形,短小,下唇2齿披针形,喉部具一上向的白色睫状毛环。花冠淡红色,长1.2—1.3厘米,外面极疏被短柔毛,散布淡黄色腺点,内面在喉部下方有白色微柔毛,冠筒长为花冠长 $1/3$,稍伸出萼外,唇片几与冠筒成直角,中裂片倒卵状近圆形,长不及唇片长 $1/2$,侧裂片卵状长圆形,后方一对向后弯折。雄蕊稍短于花冠。花柱先端2浅裂。花盘盘状,4浅裂。子房近球形。小坚果倒卵状近圆形,常非4枚同等发育,长约1毫米,暗栗棕色,背面具网纹。花期7—9月。

产福建、湖南、贵州三省南部,江西西部及南部,广东,广西,云南;生于山地阳坡,林下及灌丛中,海拔350—2400米。印度尼西亚的苏门答腊,泰国,缅甸北部,印度,锡金至尼泊尔也有。模式标本采自尼泊尔。

民间用全草治劳伤水肿,根治肚胀、泻痢,叶用于止血,治刀枪伤。

10. 矮生香科科 图版 7:1—6

Teucrium nanum C. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4): 337, pl. LXX, f. 1—6. 1965——*Teucrium simplex* auct. non Vaniot: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:191. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:293. 1929.

多年生草本,植株矮小。茎直立或上升,高20—25厘米,圆柱形,不分枝,被粗糙长柔毛。叶对生或三叶轮生,具短柄,柄长3—5毫米,被长柔毛,向上渐趋无柄;叶片长圆形或倒卵形,长2—4厘米,宽1.2—2厘米,先端圆形或钝,基部楔形下延,边缘在中部以上具圆齿,上面被长柔毛,下面被绒毛。假穗状花序顶生,长6—8厘米,序轴密被长柔毛;苞片长圆状披针形至倒卵状披针形,短于花萼;花梗短,长1.5毫米,密被黄色长柔毛。花萼钟形,长5毫米,宽3.3毫米,外面与苞片均密被黄色长柔毛,内面在喉部具疏柔毛环,二唇形,上唇发达,3齿,中齿特大,扁圆形,先端急尖,侧裂片卵圆状斜三角形,下唇2齿,钻形。花冠全长11—12毫米,外面被疏柔毛,内面被白色微柔毛,冠筒长约为花冠长之半,唇片与花冠筒成直角,中裂片近圆形,具爪,侧裂片卵圆状披针形。雄蕊伸出,花药平叉分,药隔上散见白色泡状毛,花柱先端2浅裂。花盘极小,盘状,全缘。子房圆球形,浅4裂。小坚果椭圆形,稍见网纹,棕色,长约1毫米,合生面超过果长 $1/2$ 。花期8—9月。

产云南西部,四川西南部;生于山坡草地。模式标本采自云南漾濞。

11. 安龙香科科 图版 8:8—13

Teucrium anlungense G. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10** (4): 338, pl. LXXI, f. 8—13. 1965——*Teucrium* sp. 孙雄才, 科学社生物所论文集 **7**: 243. 1932.

多年生草本。茎直立或上升, 多分枝, 细弱弯曲, 长 60—70 厘米, 被小钩毛。叶柄长 3—9 毫米, 被糙伏毛或小钩毛; 叶片小, 卵圆形或倒卵形, 长 1.2—3.8 厘米, 宽 0.8—2.2 厘米, 上面被贴生的糙伏毛, 下面被糙硬毛, 先端圆形或钝, 基部楔形下延, 边缘具波状圆齿或圆齿, 侧脉 2—3 对, 与中肋在上面凹陷, 下面凸起。穗状花序于分枝上部顶生, 由偏于一边、极松散的具 2 花的轮伞花序所组成; 苞片椭圆形至近圆形, 长 1.5—5 毫米, 宽 1.2—3.8 毫米, 具短柄, 全缘, 具缘毛; 花梗细, 长 2 毫米, 被糙伏毛或小钩毛。花萼钟形, 长 5 毫米, 宽 3.5 毫米, 外面在下部沿脉上被疏柔毛, 余部有淡黄色腺点, 内面在喉部有一环睫毛。花冠白色或淡紫色, 外面有白色泡状毛, 内面在喉部下方有泡状毛, 冠筒长 6 毫米, 唇片长达 1 厘米, 与花冠筒成直角伸出, 中裂片倒卵状近圆形, 宽约 3.8 毫米, 侧裂片前对短, 长 0.7 毫米, 后对较长, 长约 1 毫米。雄蕊及花柱均伸出。花盘小, 盘状。子房 4 浅裂, 被泡状毛。小坚果倒卵形, 长约 1 毫米, 常 2—3 枚发育, 黄棕色, 具网状纹。 花期 10 月。

产贵州西南部, 云南东部及东南部; 生于山坡开旷地上, 海拔 550—1500 米。模式标本采自贵州安龙。

云南富源用全草入药, 治小儿消化不良及腹胀病。

12. 巍山香科科 蒙化石蚕(植物分类学报 11 卷 1 期)

Teucrium manghuaense Sun ex S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4): 339, pl. LXXII, f. 7—11. 1965; ex G. H. Hu in ibid. **11**(1): 37. 1966(redescr.).

12 a. 巍山香科科 (原变种) 图版 9: 7—11

var. manghuaense

多年生草本。茎直立, 高约 40 厘米, 密被糙毛, 不分枝, 有时叶腋具叶丛。叶柄长 1—2.5 厘米, 密被长柔毛; 叶片卵圆形或椭圆形, 长 3—6 厘米, 宽 1.5—3.3 厘米, 先端急尖, 基部楔形, 全缘, 边缘具粗锯齿, 上面被糙毛, 下面疏生短柔毛。假穗状花序顶生, 有时腋生, 长 3—7 厘米, 由偏向一边、具 2 花的轮伞花序所组成; 苞片卵圆形, 长 4—8 毫米, 宽 1.7—3 毫米, 先端急尖, 基部楔形, 全缘, 具缘毛; 花梗短, 长约 1.5 毫米, 与序轴被糙毛。花萼钟形, 长 6 毫米, 外面无毛或稍被微柔毛, 内面在喉部下毛环, 萼筒长 4 毫米, 二唇形, 上唇轮廓三角形, 长 2.3 毫米, 宽 4 毫米, 3 齿, 中齿特大, 卵圆形, 长 2 毫米, 宽 3 毫米, 侧齿三角形, 下唇小, 2 齿, 齿狭三角形, 长 1.8

