

毫米,宽1毫米。花冠青白色,长12毫米,外面被短柔毛,内面喉部有短柔毛,冠筒长5.5毫米,唇片反折,伸出,与冠筒成直角,长6.5毫米,中裂片卵圆形,长2.5毫米,宽1.8毫米,近平展,侧裂片椭圆形,长1毫米。雄蕊伸出,前对较长。花柱无毛,先端不等2裂。花盘盘状,全缘。子房浅4裂。成熟小坚果未见。花期8—9月。

产云南西部;生于杂木林下,海拔2900米。模式标本采自云南巍山。

12 b. **狭苞变种** 图版9:12—14

var. **angustum** C. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):340, pl. LXXII, f. 12—14. 1965.

这一变种与原变种不同在于苞片披针形;植物体高大,近无毛;叶极大,叶片长达11厘米,宽4.5厘米,具波状圆齿。

产云南西部;生于山地杂木林下,海拔约在2000米以下。模式标本采自云南宾川鸡足山。

13. **峨眉香科科** 峨眉石蚕 (植物分类学报 11 卷 1 期),野菸 (四川峨眉)

Teucrium omeiense Sun ex S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):340, pl. LXXII, f. 1—6. 1965; ex G. H. Hu in ibid. **11**(1):38. pl. VI, f. 13. 1966 (redescr.).

13 a. **峨眉香科科**(原变种) 图版9:1—6

var. **omeiense**

多年生草本。茎直立,高约50厘米,几无毛,具少数分枝。叶柄长(0.5)1—1.5厘米,无毛;叶片卵状披针形,长3.5—12厘米,宽1.5—3.5厘米,先端急尖或渐尖,基部圆形或楔形,边缘具不规则的锯齿,上面被短柔毛,下面除脉外几无毛,侧脉3—5对,与中肋在上面微凹陷,下面明显凸起。假穗状花序长4—10厘米,于主茎及侧生小枝顶端顶生,由彼此密接、偏向一侧、具2花的轮伞花序组成;苞片披针形至线状披针形,长2.5—5毫米,宽0.8—1.5毫米,全缘或具1—2小锯齿,边缘具短柔毛;花梗长2毫米,与序轴被短柔毛或微柔毛。花萼钟形,长6毫米,疏生短柔毛或除基部外近无毛,喉部内具毛环,萼筒长4毫米,二唇形,上唇3齿,中齿近圆形,宽3毫米,先

图版8: 1—7. **大唇香科科** **Teucrium labiosum** C. Y. Wu et S. Chow. 1. 植株; 2. 花, 侧面观; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 雌蕊; 5. 花冠纵剖, 内面观; 6. 果萼; 7. 小坚果, 腹面观。8—13. **安龙香科科** **Teucrium anlungense** C. Y. Wu et S. Chow. 8. 植株上部, 示花序; 9. 花, 侧面观; 10. 花萼纵剖, 内面观; 11. 雌蕊; 12. 花冠纵剖, 内面观; 13. 小坚果, 腹面及背面观。(曾孝濂绘)