

苞片,苞叶或苞片两面被疏柔毛;序轴密被糙毛状长柔毛,花梗细,长1.5—2毫米,被密生长柔毛。花萼钟形,长6—6.5毫米,花期时为膜质,外面被疏柔毛,内面喉部有一睫毛毛环,二唇形,上唇3齿,中齿特长,圆形,先端具短尖,直径约2毫米,侧齿小,斜三角形,下唇2齿,钻状锥形,先端尾状渐尖,长2.5毫米,超过上唇中齿。花冠白色,长达1.9厘米,外面被疏柔毛,冠筒细,长9毫米,中部宽1.5毫米,唇片与冠筒成直角伸出,长达1厘米,中裂片卵圆形,长4毫米,宽2.8毫米,先端圆形,侧裂片钻状披针形,长2.2毫米。雄蕊长6—7毫米。花柱长1厘米,先端不相等2浅裂。花盘微小,盘状,全缘。子房顶端浅4裂。小坚果倒卵形,土黄色,具网纹。花期7—8月。

产贵州西部,云南东部;生于阔叶常绿林下阴湿处,海拔约2000米。模式标本采自贵州平坝。

15. 大唇香科科 山苏麻、野薄荷 (贵州贵阳) 图版 8:1—7

Teucrium labiosum G. Y. Wu et S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4): 342, pl. LXXI, f. 1—7. 1965.

多年生草本,具匍匐茎。茎上升,长60厘米左右,不分枝或于叶腋间发出短枝,四棱形,无槽,密被紫色小钩毛。叶柄长0.5—2厘米,密被紫色小钩毛;叶片卵圆状椭圆形,长3—6厘米,宽1.5—2.5厘米,先端钝或急尖,基部楔形至阔楔形下延,边缘具带重齿的圆齿,上面被微柔毛或近无毛,下面除脉上被短柔毛外近无毛。假穗状花序形成于主茎及腋出短枝上部,在短枝上者短,长3—4厘米,在主茎上者长达15厘米,由偏向于一侧、具2花的轮伞花序所组成,位于假穗状花序下部的1—2个轮伞花序远离,其余向上渐紧密;苞叶下部者与叶同形但较小,向上渐呈苞片状,苞片卵圆形,近无柄,全缘,上面近无毛,下面密被短柔毛;花梗长2—2.5毫米,果时达4毫米,密被短柔毛。花萼钟形,长5毫米,外面被短柔毛,喉部内面有一睫毛毛环,二唇形,上唇3齿,中齿近圆形,先端急尖,宽2毫米,侧齿三角形,下唇2齿,齿钻形,长2.5毫米,超过上唇。花冠白色,长达2厘米,冠筒极细长,长约8毫米,宽1.2毫米,外被疏柔毛,唇片长达12毫米,与花冠筒成直角伸展,中裂片菱状扁圆形,长4.5毫米,宽5毫米,先端急尖,基部狭,缢缩成短柄,后方一对侧裂片线状披针形,先端具缘毛。雄蕊露出。花盘微小,浅盘状,全缘。子房球形,4浅裂,被泡状毛。小坚果倒卵形,长1.1毫米,黄棕色,微现网纹。花期7—8月。

产云南中部(昆明附近),贵州中部及东北部,四川南部;生于山地林下,海拔约1150米。模式标本采自贵州贵阳花溪。

组 4.二齿香科 科组——Sect. *Pleurobotrys* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **26**: 311.1890 p. p.——*Kinostemon* Kudo in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **19**:2. 1929, et in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:298. 1929, p. p.

轮伞花序具 2—6 花，于茎及短于叶的腋生短枝上部组成假穗状花序；花萼二唇形，上唇特大，喉部内具毛环；花冠后方弯缺狭窄；雄蕊为花冠筒长之二倍；小坚果具网纹。

16. 庐山香科科 图版 10:1—6

Teucrium pernyi Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris **6**(2):625.1883, Pl. David. **1**:245. 1884, quoad specim. David 756 tantum.; S. Chow in Act. Phytotax. Sin. **10**(4):343. pl. LXXIII. f. 1—6.1965——*Teucrium ningpoense* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:313.1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 170.1915; Belval in Mus. Heude Notes Bot. Chin. no. **2**:104. 1933——*Teucrium bidentatum* auct. non Hemsl.: Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:912.1936, p. p., quoad Hand.-Mazz. 12703——*Kinostemon pernyi* (Franch.) Kudo in Tans. Nat. Soc. Formosa **19**:2. 1929, quoad nomen tantum——*Kinostemon ningpoense* (Hemsl.) Kudo in Journ. Soc. Trop. Agr. Taiwan **2**:146. 1930——*Kinostemon pernyi* (Franch.) Kudo var. *ningpoense* (Hemsl.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:299.1929.

多年生草本，具匍匐茎。茎直立，基部常不分枝而具早年残存的茎基，基部近圆柱形，上部四棱形，无槽，高 60 厘米，有时达 100 厘米，密被白色向下弯曲的短柔毛，毛长 0.5 毫米。叶柄长 3—7 毫米，被毛同茎；叶片卵圆状披针形，长 3.5—5.3 厘米，宽 1.5—2 厘米，有时长达 8.5 厘米，宽达 3.5 厘米，先端短渐尖或渐尖，基部圆形或阔楔形下延，边缘具粗锯齿，两面被微柔毛，下面脉上被白色稍弯曲的短柔毛，侧脉 3—4 对，有时 5 对，两面微显著。轮伞花序常 2 花，松散，偶达 6 花，于茎及短于叶的腋生短枝上组成穗状花序；苞片卵圆形，被短柔毛，长与花梗相若；花梗长 3—4 毫米，被短柔毛。花萼钟形，下方基部一面臃，长 5 毫米，宽 3.5 毫米，外面被稀疏的微柔毛，喉部内面具毛环，10 脉，二唇形，上唇 3 齿，中齿极发达，近圆形，先端突尖，侧齿三角状卵圆形，长不达中齿之半，下唇 2 齿，齿三角状钻形，渐尖，与上唇中齿同高，齿间缺弯深裂至喉部，各齿具发达的网状侧脉。花冠白色，有时稍带红晕，长 1 厘米，冠筒稍稍伸出，长 4.5 毫米，外面被稀疏的微柔毛，唇片与花冠筒成直角，中裂片极发达，椭圆状匙形，内凹，长 4 毫米，宽 2.6 毫米，先端急尖，后方一对裂片斜三角状卵圆

