

..... 2. 宽叶薰衣草 *L. latifolia* Vill.

## 1. 薰衣草(种子植物名称补编) 图版 50:1—9

*Lavandula angustifolia* Mill Gard Dict ed. 8; no. 2. 1768—*L. spica* Linn. Sp. Pl. 572, 1753, exclud.  $\beta$ ; Briq. Lab Alp Marit 3:464. 1895—*L. vera* DC. in Lam. et DC. Fl. France 5:398. 1815.

半灌木或矮灌木, 分枝, 被星状绒毛, 在幼嫩部分较密; 老枝灰褐色或暗褐色, 皮层作条状剥落, 具有长的花枝及短的更新枝。叶线形或披针状线形, 在花枝上的叶较大, 疏离, 长3—5厘米, 宽0.3—0.5厘米, 被密的或疏的灰色星状绒毛, 干时灰白色或橄榄绿色, 在更新枝上的叶小, 簇生, 长不超过1.7厘米, 宽约0.2厘米, 密被灰白色星状绒毛, 干时灰白色, 均先端钝, 基部渐狭成极短柄, 全缘, 边缘外卷, 中脉在下面隆起, 侧脉及网脉不明显。轮伞花序通常具6—10花, 多数, 在枝顶聚集成间断或近连续的穗状花序, 穗状花序长约3(5)厘米, 花序梗长约为花序本身3倍, 密被星状绒毛; 苞片菱状卵圆形, 先端渐尖成钻状, 具5—7脉, 干时常带锈色, 被星状绒毛, 小苞片不明显; 花具短梗, 蓝色, 密被灰色、分枝或不分枝绒毛。花萼卵状管形或近管形, 长4—5毫米, 13脉, 内面近无毛, 二唇形, 上唇1齿较宽而长, 下唇具4短齿, 齿相等而明显。花冠长约为花萼的2倍, 具13条脉纹, 外面被与花萼同一毛被, 但基部近无毛, 内面在喉部及冠檐部分被腺状毛, 中部具毛环, 冠檐二唇形, 上唇直伸, 2裂, 裂片较大, 圆形, 且彼此稍重叠, 下唇开展, 3裂, 裂片较小。雄蕊4, 着生在毛环上方, 不外伸, 前对较长, 花丝扁平, 无毛, 花药被毛。花柱被毛, 在先端压扁, 卵圆形。花盘4浅裂, 裂片与子房裂片对生。小坚果4, 光滑。花期6月。

原产地地中海地区; 我国已有栽培, 为一种观赏及芳香油植物。

花中含芳香油, 油是调制化妆品、皂用香精的重要原料, 尤为棕榄型香皂及花露水香精中的主要原料。鲜花含油率0.8%, 干花含油率1.5%左右, 精油主要成分为乙酸芳樟醇、丁酸芳樟醇及香豆素。

## 2. 宽叶薰衣草 图版 50:10—11

*Lavandula latifolia* Vill. Hist. Pl. Dauphine 2:363. 1787.

半灌木, 分枝; 枝四棱形, 具槽, 密被短的星状绒毛, 在幼嫩部分特别密, 具极长的节间。叶在基部丛生, 在较上部极稀疏, 狹披针形或线状披针形及线形, 长2—4厘米, 宽0.2—0.5厘米, 先端钝或近急尖, 基部渐狭成柄, 全缘, 边缘外卷, 干时带灰白色或暗褐色, 两面均被极小而密的星状绒毛, 中脉在两面多少有些隆起, 侧脉及网脉不明显。轮伞花序具4—6花, 疏松, 由7—8轮组成顶生而间断的穗状花序, 穗状花

