

毛, 齿 5, 呈二唇形, 上唇 3 齿较长, 下唇 2 齿较短, 均卵形, 长 1.5—2 毫米, 顶端具细尖, 针状, 边缘具缘毛。花冠淡紫色, 直伸, 漏斗状, 长 1.5—2 厘米, 外面露出部分被柔毛及微柔毛, 内面仅下唇喉部被疏柔毛, 冠檐二唇形, 上唇直立, 顶端深凹, 裂片近圆形, 下唇直伸, 3 裂, 中裂片长而宽, 扇形, 顶端微凹, 两侧裂片卵形, 与上唇等长。雄蕊 4, 无毛, 内藏, 后对着生于上唇下方花冠喉部, 略高, 前对着生于下唇侧裂片下方花冠筒中部, 较低, 花药 2 室, 略叉开。子房 4 裂, 无毛。花盘杯状, 微斜。花柱无毛, 先端 2 裂。小坚果深褐色, 长圆状卵形, 顶端浑圆, 基部微三棱形, 果脐不甚明显。花期 4—5 月, 果期 6 月。

产江苏及台湾; 生于路旁、屋边阴湿处。日本有分布。模式标本采自日本。

5. 大花活血丹 大筋草(云南龙陵) 图版 63

Glechoma sinograndis G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8:7, pl. 1.1959;
G. Y. Wu et G. Chen in ibid. 12(1):33.1974.

多年生草本, 高达 25 厘米, 具细根及匍匐茎, 上升, 逐节生根。茎四棱形, 全部被稀疏长柔毛, 毛蜷曲而具节。叶草质, 茎下部的叶较小, 肾形, 具长柄, 被具节长柔毛; 茎上部的叶较大, 心状肾形, 长 1—3.5 厘米, 宽 1.5—5 厘米, 先端近圆形或钝, 基部心形, 具长方形开展的基凹, 边缘具圆齿, 齿稀且具小尖突, 上面被极疏的短硬毛, 以叶脉尤其近基部的脉上为多, 下面常带紫色, 有稀疏的细红点, 被疏微柔毛, 沿脉被短而具节的平展硬毛, 叶柄长为叶片的 1.5—2 倍, 被较密的具节长柔毛。轮伞花序在茎中部叶腋内, 常仅有 2 花, 稀至 4 花, 总梗长不足 5 毫米, 花梗长约 3 毫米, 均被具节长柔毛; 苞片及小苞片线状钻形, 被缘毛。花萼管形, 长 1—1.2 厘米, 外面脉上被极疏的具节长柔毛及细腺点, 内面无毛, 齿 5, 略呈二唇形, 上唇 3 齿略长, 下唇 2 齿较短, 齿均三角状披针形, 长几达花萼全长 1/3, 顶端芒状, 边缘具缘毛。花冠粉红色或淡蓝色, 直伸, 漏斗状, 长 2.5—2.7 厘米, 外面多少被疏柔毛, 内面在下唇喉部具长柔毛, 冠檐二唇形, 上唇直立, 顶端深凹, 下唇直伸, 3 裂, 中裂片近圆形, 顶端凹入, 边缘呈微波状, 两侧裂片卵形, 与上唇等长。雄蕊 4, 无毛, 内藏, 后对着生于花冠上唇下方的喉部, 略长, 前对着生于下唇侧裂片下方的冠筒中部, 较短; 花药 2 室, 略叉开。子房 4 裂, 无毛。花盘杯状, 微斜, 前方呈指状膨大。花柱细长, 无毛, 先端 2 裂。小坚果深褐色, 长圆状卵形, 长约 2 毫米, 宽约 1 毫米, 顶端近圆形, 基部微三棱形, 光滑, 微亮, 果脐不明显。花期 4—5 月, 果期 6 月。

产云南西部、西北部及东北部; 生于沟边杂木林中湿润处, 海拔 2000—2900 米。模式标本采自云南维西。

云南龙陵用全草配方治小儿支气管炎。

23. 台钱草属——*Suzukia* Kudo

Kudo in Journ. Soc. Trop. Agri. 2:145.1930.

草本，通常具匍匐茎。茎上升或匍匐状，全部具叶。叶具长柄，叶片通常呈圆形、心脏形或肾形，边缘具齿。轮伞花序少花，腋生，组成间断的总状花序；苞叶与茎叶同形。花萼倒圆锥状钟形，具5脉，齿5，卵状正三角形，微呈二唇形，上唇3齿，略大，下唇2齿，略小，顶端微弯。花冠管状，上部宽，近基部具毛环，冠檐二唇形，上唇卵形，盔状，下唇大，中裂片倒梯形，顶端深凹，侧裂片长椭圆状倒卵形。雄蕊4，二强，前对稍长，均远伸出花冠筒喉部以外，花丝宽展，花药2室，室平行。子房4裂。花柱先端2裂，裂片近相等。花盘前方膨大。小坚果明显的三棱形，背部及顶端圆形，光亮，无毛。

仅2种，2种均产我国台湾，其中1种与日本琉球群岛共有。

本属植物外形与活血丹属植物近似，但花萼倒圆锥状钟形，5脉，花冠筒基部有毛环，花丝远伸出花冠以外等特征而与该属有区别。虽然正宗严敬对本属的成立与否曾经提出了非议，但根据上述特征，看来本属与活血丹属是有足够区别，显系后一属向海岛分布，分化和特化衍生出来的一个类群。故我们仍然采用工藤祐舜的意见。

分 种 检 索 表

1. 花冠下唇中裂片全缘 1. 台钱草 *S. shikikunensis* Kudo
 1. 花冠下唇中裂片明显具不规则齿缺 2. 齿唇台钱草 *S. luchuensis* Kudo

1. 台钱草 图版 64

Suzukia shikikunensis Kudo in Journ. Soc. Trop. Agr. 2:145.1930——
Glechoma shikikunensis (Kudo) Masam. in Hokuriku Journ. Bot. 4:88.1955.

草本。茎具长匍匐茎，匍匐茎纤细，具四槽，密被平展的白色长硬毛，节间伸长，长1.5—3.5厘米，比叶长得多。叶近圆形、肾状圆形或稀近心形，长宽约1—1.5厘米，先端近圆形，基部浅心形，边缘疏具齿，齿卵状正三角形或圆状卵形，顶端具胛体的短尖，膜质，两面绿色或下面色较淡，两面疏被白色长硬毛，侧脉约4对，两面略明显；叶柄细，长5—10毫米，腹凹背凸，被极平展而密的长硬毛。轮伞花序通常2花，通常生于自匍匐茎节上抽出的长2.5—3厘米的短枝上部，常3—4个组成间断的总状花序，但也有生于茎枝上部节上而远离；苞叶与叶同形，但在短枝上者则十分变小，

