

云南龙陵用全草配方治小儿支气管炎。

23. 台钱草属——*Suzukia* Kudo

Kudo in Journ. Soc. Trop. Agri. **2**:145.1930.

草本,通常具匍匐茎。茎上升或匍匐状,全部具叶。叶具长柄,叶片通常呈圆形、心脏形或肾形,边缘具齿。轮伞花序少花,腋生,组成间断的总状花序;苞叶与茎叶同形。花萼倒圆锥状钟形,具5脉,齿5,卵状正三角形,微呈二唇形,上唇3齿,略大,下唇2齿,略小,顶端微弯。花冠管状,上部宽,近基部具毛环,冠檐二唇形,上唇卵形,盔状,下唇大,中裂片倒梯形,顶端深凹,侧裂片长椭圆状倒卵形。雄蕊4,二强,前对稍长,均远伸出花冠筒喉部以外,花丝宽展,花药2室,室平行。子房4裂。花柱先端2裂,裂片近相等。花盘前方膨大。小坚果明显的三棱形,背部及顶端圆形,光亮,无毛。

仅2种,2种均产我国台湾,其中1种与日本琉球群岛共有。

本属植物外形与活血丹属植物近似,但花萼倒圆锥状钟形,5脉,花冠筒基部有毛环,花丝远伸出花冠以外等特征而与该属有区别。虽然正宗严敬对本属的成立与否曾经提出了非议,但根据上述特征,看来本属与活血丹属是有足够区别,显系后一属向海岛分布,分化和特化衍生出来的一个类群。故我们仍然采用工藤祐舜的意见。

分种检索表

1. 花冠下唇中裂片全缘 1. 台钱草 *S. shikikunensis* Kudo
 1. 花冠下唇中裂片明显具不规则齿缺 2. 齿唇台钱草 *S. luchuensis* Kudo

1. 台钱草 图版 64

Suzukia shikikunensis Kudo in Journ. Soc. Trop. Agr. **2**:145.1930—
Glechoma shikikunensis (Kudo) Masam. in Hokuriku Journ. Bot. **4**:88.1955.

草本。茎具长匍匐茎,匍匐茎纤细,具四槽,密被平展的白色长硬毛,节间伸长,长1.5—3.5厘米,比叶长得多。叶近圆形、肾状圆形或稀近心形,长宽约1—1.5厘米,先端近圆形,基部浅心形,边缘疏具齿,齿卵状正三角形或圆状卵形,顶端具胼胝体的短尖,膜质,两面绿色或下面色较淡,两面疏被白色长硬毛,侧脉约4对,两面略明显;叶柄细,长5—10毫米,腹凹背凸,被极平展而密的长硬毛。轮伞花序通常2花,通常生于自匍匐茎节上抽出的长2.5—3厘米的短枝上部,常3—4个组成间断的总状花序,但也有生于茎枝上部节上而远离;苞叶与叶同形,但在短枝上者则十分变小,

云南龙陵用全草配方治小儿支气管炎。

23. 台钱草属——*Suzukia* Kudo

Kudo in Journ. Soc. Trop. Agri. **2**:145.1930.

草本,通常具匍匐茎。茎上升或匍匐状,全部具叶。叶具长柄,叶片通常呈圆形、心脏形或肾形,边缘具齿。轮伞花序少花,腋生,组成间断的总状花序;苞叶与茎叶同形。花萼倒圆锥状钟形,具5脉,齿5,卵状正三角形,微呈二唇形,上唇3齿,略大,下唇2齿,略小,顶端微弯。花冠管状,上部宽,近基部具毛环,冠檐二唇形,上唇卵形,盔状,下唇大,中裂片倒梯形,顶端深凹,侧裂片长椭圆状倒卵形。雄蕊4,二强,前对稍长,均远伸出花冠筒喉部以外,花丝宽展,花药2室,室平行。子房4裂。花柱先端2裂,裂片近相等。花盘前方膨大。小坚果明显的三棱形,背部及顶端圆形,光亮,无毛。

仅2种,2种均产我国台湾,其中1种与日本琉球群岛共有。

本属植物外形与活血丹属植物近似,但花萼倒圆锥状钟形,5脉,花冠筒基部有毛环,花丝远伸出花冠以外等特征而与该属有区别。虽然正宗严敬对本属的成立与否曾经提出了非议,但根据上述特征,看来本属与活血丹属是有足够区别,显系后一属向海岛分布,分化和特化衍生出来的一个类群。故我们仍然采用工藤祐舜的意见。

分种检索表

1. 花冠下唇中裂片全缘 1. 台钱草 *S. shikikunensis* Kudo
 1. 花冠下唇中裂片明显具不规则齿缺 2. 齿唇台钱草 *S. luchuensis* Kudo

1. 台钱草 图版 64

Suzukia shikikunensis Kudo in Journ. Soc. Trop. Agr. **2**:145.1930—
Glechoma shikikunensis (Kudo) Masam. in Hokuriku Journ. Bot. **4**:88.1955.

草本。茎具长匍匐茎,匍匐茎纤细,具四槽,密被平展的白色长硬毛,节间伸长,长1.5—3.5厘米,比叶长得多。叶近圆形、肾状圆形或稀近心形,长宽约1—1.5厘米,先端近圆形,基部浅心形,边缘疏具齿,齿卵状正三角形或圆状卵形,顶端具胼胝体的短尖,膜质,两面绿色或下面色较淡,两面疏被白色长硬毛,侧脉约4对,两面略明显;叶柄细,长5—10毫米,腹凹背凸,被极平展而密的长硬毛。轮伞花序通常2花,通常生于自匍匐茎节上抽出的长2.5—3厘米的短枝上部,常3—4个组成间断的总状花序,但也有生于茎枝上部节上而远离;苞叶与叶同形,但在短枝上者则十分变小,

