

specim. Kweichow.—*Dracocephalum urticifolia* (Miq.) Makino var. *angustifolia* (Dunn) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7:916.1936(?), et in Beih. Bot. Centralbl. 56B(3):458.1937.

一年生草本，高约 50 厘米，直立。茎细弱，不分枝，除幼嫩部分被短柔毛或倒生短柔毛及节上被柔毛外，余部无毛。叶具柄，柄长 4—25 毫米，向上渐变短，嫩时有毛或仅腹面有毛，其后变无毛；叶片纸质，狭披针形或披针形，有时微弯，长 6—12 厘米，宽 1.2—2.5 厘米，通常着生于茎中部的叶片较大，先端渐尖，基部圆形或近楔形，边缘具疏细齿或疏微波状细齿，上面被极疏的微柔毛，以叶缘较多，中脉下陷，下面仅脉上被疏微柔毛，中脉隆起。花通常仅 1 朵，腋生于茎上部节上，稀组成假总状花序；苞片向上渐变小，披针形，长 2.5 厘米以下，边缘具齿或几全缘，两面多少被微柔毛，具缘毛；花梗短，长 1—4 毫米，中部具 1 对小苞片；小苞片钻形，长约 1 毫米。花萼花时管形，口部微开张，通常长约 1.2 厘米，具 15 脉，外面被微柔毛，内面无毛，齿 5，呈二唇形，上唇 3 齿，较高，下唇 2 齿，齿三角状卵形或近三角形，长为花萼全长的 $\frac{2}{5}$ ，具缘毛，先端渐尖，果时萼筒基部膨大呈囊状。花冠红色或紫色，长 2.5—4 厘米，外面被短柔毛，至檐部渐变少，内面在冠筒基部被柔毛，但不成毛环，冠筒管状，直立或微弯，上半部逐渐扩大，冠檐二唇形，上唇直立，扁圆形，顶端内凹，下唇增大，伸长，3 裂，中裂片扇形，顶端微凹，内面具疏柔毛，两侧裂片长圆形，大小为中裂片之半。雄蕊 4，略二强，内藏，后对着生于上唇下的花冠喉部，前对着生于下唇侧裂片下方的冠筒中部，花丝细，无毛，花药 2 室，具短柔毛。子房 4 裂，无毛，具不甚明显的小突起。花柱细长，略长于雄蕊，微伸出花冠，先端 2 裂。花盘杯状，裂片不明显，前方呈指状膨大。小坚果卵状长圆形，腹部微呈三棱形，密被短柔毛，基部有一小果脐。花期 5—7 月，果期 7 月以后。

产贵州中部（贵阳、龙里、平坝）；生于坡边或山间林下。模式标本采自贵州平坝。

26. 长蕊青兰属——*Fedtschenkiella* Kudr.

Kudr. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Sci. Uzbekist. Acad. Sci. URSS 4:3.1941——*Dracocephalum* Sect. *Moldavica* Subsect. *Androdracontes* Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:239.1897——*Dracocephalum* Subg. *Fedcszenkiella* Schischk. in Fl. URSS 20:473.1954.

多年生草本。茎不分枝或具少数分枝。叶具圆牙齿，茎下部叶柄长过叶片，中部叶的叶柄与叶片等长或稍过之。轮伞花序生于茎上部，在茎最上部2—3对叶腋者密集成头状；苞叶叶状，边缘锯齿具长刺，苞片之齿亦具长刺。花萼管状钟形，15脉，明显二唇形，齿间无小瘤，外面被绵毛，上唇3裂至本身1/3处，3齿近等大，齿间有刺状附属物，下唇2裂至基部，齿披针形。花冠蓝紫色，二唇形，二唇近等长，上唇直，顶端2裂，下唇3裂，中裂片最大。雄蕊4，后对较前对长，远伸出花冠之外，花药顶生，2室，室近水平叉开。花盘杯状，明显4裂。子房4裂。花柱先端相等2裂。小坚果长圆形，腹部具棱，背部圆形，无毛。

单种属，产于中亚。在我国仅产于新疆。

1. 长蕊青兰 图版 68:15—21

Fedtschenkiella staminea (Kar. et Kir.) Kudr. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Sci. Uzbekist. Acad. Sci. URSS **4**:3.1941——*Dracocephalum stamineum* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Moscou **15**:423.1842; Benth. in DG. Prodr. **12**:398. 1848; Ledeb. Fl. Ross. **3**:384.1849; Lipsky in Act. Hort. Petrop. **26**:602. 1910; Schischk. in Fl. URSS **20**:473.1954——*Dracocephalum pulchellum* Briq. in Bot. Tidsskr. **28**:241, f. 4.1908.

根茎斜，粗3—5毫米，顶端分枝。茎多数，渐升，长10—27厘米，不分枝或具少数分枝，不明显四棱形，紫红色，被倒向的小毛，在花序以下的节间长6—9厘米，到花序处节间突然强烈缩短，长0.8—1.5厘米。茎下部叶具长柄，柄较叶片长4—5倍，中部叶的叶柄与叶片等长或稍过之；叶片草质，宽卵形，长0.8—1.3厘米，宽0.7—1.4厘米，先端钝，基部心形，边缘具圆牙齿，两面疏被小柔毛，下面具金黄色腺点，花序上者变小，锯齿尖锐。轮伞花序生于茎上部，在茎最上部2—3对叶腋者密集成头状；花具梗；苞叶叶状，其锯齿具长达3.6毫米的长刺；苞片小，长2—3毫米，椭圆状卵形或倒卵形，密被长柔毛，具4—5个小齿，齿具长2.5—4.5毫米的长刺。花萼长6—7毫米，外密被绵毛，2裂达中部，紫色，上唇3裂至本身长度1/3处，3齿近等大，三角状卵形，先端刺状渐尖，中齿基部有2个具长刺的小齿，下唇较上唇稍短，2裂几达基部，齿披针形。花冠蓝紫色，长约8毫米，外被短柔毛，二唇近等长。后对雄蕊长约11毫米，远伸出花冠之外。小坚果长圆形，长约2毫米，宽约1.2毫米，黑褐色。

产新疆；生于海拔1700—2500米山地、草坡或溪边。苏联也有。模式标本采自苏联。