

直立多年生草本，有纤维状须根。茎直立，高 60—80 厘米，四棱形，具槽，被倒向的疏柔毛，纤细，多分枝，几从基部生出，分枝叉开，其上有花序。茎叶卵圆状至长圆状心形，长 5—6 厘米，宽约 2.3 厘米，先端锐尖，基部心形，边缘有整齐的圆齿，间或有重圆齿，上面绿色，略有皱纹，被柔毛，下面灰绿色，密被柔毛，侧脉 4—5 对，上面稍凹陷，下面隆起，叶柄长 0.6—2.5 厘米，近扁平，密被柔毛；苞叶无柄，向上渐变小，卵圆形，毛被同茎叶。轮伞花序多花，约 10 花，远离，或在枝条顶端者彼此靠近，其下承以少数小苞片；小苞片线形，被柔毛，长 2—5 毫米，通常长为萼长之半；花梗极短或近于无，长均在 1.5 毫米以下。花萼在花时连齿长 5—7 毫米，倒圆锥形，长与宽几相等，外疏被柔毛，内面在萼齿被柔毛，余均被短柔毛，10 脉，不显著，齿 5，三角形，长 1.5 毫米，近等大或后 3 齿较大，先端具硬尖头。花冠粉红色，长达 1.3 厘米，外面除冠筒中部以下无毛外，余部被微柔毛，内面在唇片疏被微柔毛，在冠筒中部有明显或不明显的微柔毛环，冠筒长 7 毫米，近于等大，冠檐二唇形，上唇直立，卵圆形，长 3 毫米，全缘，下唇平展，长 6 毫米，3 裂，中裂片极大，倒心形，侧裂片卵圆形，微小。雄蕊 4，前对较长，均延伸至上唇片中部附近，花丝丝状，被微柔毛，花药卵圆形，2 室，室极叉开。花柱丝状，略超出雄蕊，先端相等 2 浅裂。花盘于前方微呈指状膨大。子房无毛。小坚果卵珠状三棱形，长约 2 毫米，背面圆凸，腹面具稜，褐色，无毛。花期 7 月，果期 8 月。

产西藏(山南)；生于林荫潮湿地，海拔 3100 米。尼泊尔，锡金也有。模式标本采自尼泊尔。

### 3. 直花水苏

*Stachys strictiflora* C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 10 (3): 220. 1965.

#### 3a. 直花水苏(原变种) 图版 3:7—9

##### var. *strictiflora*

劲直多年生草本；根茎不肥大，匍匐，自节上生出纤维状须根。茎直立，高 30—60 厘米，四棱形，具四槽，有倒向的疏柔毛，在上部间杂有具腺微柔毛，纤弱，少分枝或不分枝。茎生叶三角状卵圆心形，长 3—5 厘米，宽 2—3 厘米，先端锐尖，基部心形，边缘有规则的圆齿，上面绿色，略有皱纹，密被绢质小疏柔毛，下面灰绿色，密被疏柔毛，侧脉 4—5，在上面稍凹陷，下面略显著，叶柄长 0.7—1.5 厘米，扁平，腹面具浅槽，密被疏柔毛；苞叶渐变小，三角状长圆形或卵圆形，先端锐尖，基部浅心形、截形或近圆形，具短柄或近于无柄，毛被同茎叶。轮伞花序 2—6 花，远离，在茎端者彼此靠近，其下承以少数苞片；苞片线形，短小，长约 2 毫米，密被疏柔毛；花梗极短或近于无，长不