

## 12. 蝴儿菜(江苏泰县) 宝塔菜(安徽九华山)

**Stachys arrecta** L. H. Bailey in Gentes Herb. 1: 43. 1920.

多年生草本,高40—60厘米,有簇生须根的横走肉质根茎。茎直立,自基部至中部均多分枝,分枝细弱,茎及分枝四棱形,具槽,密被柔毛。茎生叶心形,长2.5—6.5厘米,宽1.5—3厘米,先端渐尖,基部心形,边缘具整齐的细圆齿或圆齿状锯齿,纸质,上面散布柔毛,下面沿脉上密被柔毛,余部被柔毛及杂有腺点,侧脉3—5对,上面不显著或略凹陷,下面明显隆起,叶柄长0.5—1.5厘米,腹平背凸,密被柔毛;最下部的苞叶与茎叶同形但较小,上部的苞叶披针形,细小,无柄。轮伞花序2—6花,少数远离生于枝条的顶端;小苞片细小,线形,长约1毫米,被柔毛;花梗短,长约1毫米,被柔毛。花萼管状钟形,细小,连齿在内长约5毫米,外面密被具腺或无腺的柔毛,内面在上部疏被微柔毛,脉10,明显,齿5,近等大,狭三角形,长2—2.5毫米,先端渐尖,有硬尖尖头。花冠粉红色,长1.2厘米,冠筒长约0.8厘米,近等大,外面在伸出萼筒部分上被微柔毛,内面在近基部1/3处有不明显的微柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇直立,长圆状卵圆形,长3毫米,宽2毫米,外面被微柔毛,内面无毛,下唇略开张,近圆形,长约4毫米,宽3.5毫米,外面被微柔毛,内面无毛,3裂,中裂片稍大。雄蕊4,前对较长,均上升至上唇片之下或略超出,花丝丝状,被微柔毛,花药卵圆形,2室,室极叉开。花柱丝状,先端相等2浅裂,裂片钻形,极叉开。花盘平顶。子房黑褐色,无毛。小坚果卵珠形,长1.5毫米,褐色,具瘤。花期7—8月,果期9—10月。

产江苏,浙江,安徽,湖南,河南,湖北,陕西,山西等地;生于丛林及阴湿的沟谷中,海拔1500—2050米。模式标本采自我国。

13. 地蚕(植物分类学报10卷3期) 冬虫夏草(广西桂平),五眼草(广西),野麻子(江西太和)

**Stachys geobombycis** C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 10 (3): 222. 1965  
—*Stachys aspera* auct. non Michx.: Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 211. 1912—*Stachys kouyangensis* auct. non (Vaniot) Dunn: Merr. in Sun-yatsenia 1 (4): 207. 1934—*Stachys arrecta* auct. non L. H. Bailey: Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 924. 1936.

## 13a. 地蚕(原变种)

var. **geobombycis**

多年生草本,高40—50厘米;根茎横走,肉质,肥大,在节上生出纤维状须根。茎直立,四棱形,具四槽,在稜及节上疏被倒向疏柔毛状刚毛。茎叶长圆状卵圆形,长