

毫米,外面被微柔毛,内面无毛,下唇水平展开,轮廓近圆形,宽约 5 毫米,外面疏被微柔毛,内面无毛,3 裂,中裂片较大,近圆形,宽约 3 毫米,侧裂片卵圆形,宽 1.5 毫米。雄蕊 4,前对较长,均延伸至上唇片之下,花丝丝状,被微柔毛,先端略膨大,花药卵圆形,2 室,室纵裂,略叉开。花柱丝状,超出雄蕊,向前下倾,先端相等 2 浅裂,裂片钻形。花盘杯状。子房褐色,无毛。花期 7—8 月。

产四川东部,湖北西部;生于竹林下,海拔 800 米。模式标本采自四川洪雅。

系 4. 西南水苏系——*Ser. Kouyangenses* C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax Sin. **10** (3): 227. 1965.

根茎非肉质。叶短小,三角状心形或戟状三角形。

17. 西南水苏(植物分类学报 10 卷 3 期) 破布草、麻布草、野甘露、铁骡子、白根药(云南),猫猫菜(四川叙永),山菠萝子(四川雷波)

Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 167. 1913; et in ibid. **6**: 180. 1915, p. p., excl. syn. *St. franchetiana* Lévl.; C. Y. Wu etc. in Act. Phytotax. Sin. **10** (3): 227. 1965——*Lamium kouyangense* Vaniot in Bull. Acad. Internat. Géogr. Bot. **14**: 175. 1904; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 492. 1911——*Stachys cardiophylla* Prain ex Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 497. 1911——*Stachys cordifolia* auct. non C. Koch: Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal **59**: 310. 1890; Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**: 246, 314. 1912; **8**: 403. 1913——*Stachys franchetiana* auct. non Lévl.: Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**: 135, 314. 1912; **8**: 403. 1913——*Stachys palustris* auct. non Linn.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 181. 1915, p. p. quoad specimen Forr. 4523——*Stachys sieboldi* auct. non Miq.: Hand. Mazz. in Act. Hort. Götthob. **13**: 147. 1939, p. p.

17a. 西南水苏(原变种) 图版 3: 1—6

var. ***kouyangensis***

多年生草本,高约 50 厘米,有在节上生须根的匍匐根茎。茎纤细,曲折,基部伏地,单一或多分枝,四棱形,具槽,在棱及节上被刚毛。茎叶三角状心形,长约 3 厘米,宽约 2.5 厘米,先端钝,基部心形,边缘具圆齿,两面均被或疏或密的刚毛,叶柄近于扁平,长约 1.5 厘米,被刚毛;苞叶向上渐变小,位于最下部的与茎叶同形,上部者卵圆状三角形,几无柄,边缘有疏圆齿,长不及萼筒。轮伞花序 5—6 花,远离,于枝顶组成不密集的穗状花序;苞片微小,线状披针形,长约 1 毫米,被微柔毛。常早落;花梗