

这一变种与原变种不同在于幼部特别是叶下面及花萼密被绢状短柔毛。

产云南;生于空旷地,海拔 1200—1900 米。模式标本采自云南昆明。

17c. **粗齿变种** 黄狼鼠花(四川黑水)

var. **franchetiana** (Lévl.) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(3): 228. 1965
——*Stachys franchetiana* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **13**: 246. 1911——*Stachys chinensis* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gôthob. **13**: 348. 1939, p. p. quoad syn. *S. franchetiana* Lévl.——*Stachys kouyangensis* (Vaniot) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 180. 1915, p. p. quoad syn. *St. franchetiana* Lévl.

这一变种与原变种不同在于萼齿线形,具刺尖,近开张;叶戟状三角形,基部近平截,边缘具粗大圆齿。

产四川西部,云南西北部及西藏东部;生于草坡、沟边及水田边,海拔 2360—3800 米。模式标本采自四川康定。

组 3. 田野水苏组——Sect. *Olisia* Dumort. ex Boiss. Fl. Or. **4**:716. 1879.

一年生植物。

18. **田野水苏**

Stachys arvensis Linn. Sp. Pl. ed. **2**: 814. 1762; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 550. 1834; et in DC. Prodr. **12**: 477. 1848; Ledeb. Fl. Ross. **3**: 415. 1849; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 300. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 181. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 192. 1929; Knorr. in Fl. URSS **21**: 237. 1954.

一年生植物,高 30—50 厘米,有在节上生须根的根茎。茎纤弱,在干燥地上近于直立,在湿地及耕地上近于外倾,四棱形,具浅槽,疏被柔毛,多分枝。茎叶卵圆形,长约 2 厘米,宽约 1 厘米,先端钝,基部心形,边缘具圆齿,上面疏被柔毛,下面沿脉上疏被柔毛,余部密被短柔毛,叶柄扁平,被柔毛;苞叶细小,卵圆形或卵圆状披针形,边缘具数齿或近全缘,具短柄或近无柄,最上部的苞叶无柄,基部楔形,比花萼短。轮伞花序腋生,具 2—(4) 花,多数,远离;苞片线形,细小,长约 1 毫米,被柔毛;花梗长约 1 毫米,被柔毛。花萼管状钟形,细小,初花时连齿长约 3 毫米,外密被柔毛,内面在上部被柔毛,10 脉,明显,肋间次脉在萼筒基部多少显著,齿 5,近等大,披针状三角形,长约 1 毫米,先端锐尖,果时花萼呈壶状增大,外面脉纹尤为显著。花冠红色,长约 3 毫米,几不超出萼,冠筒内藏,冠檐二唇形,上下唇近等长,上唇直立、卵圆形,长约 1