

增大。花冠筒与花萼等长,内面有小疏柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇直伸,短,全缘,微凹,下唇平展,长,3裂,中裂片较大,先端微缺或2裂,侧裂片短。雄蕊4,伸出,二强,前对稍长或有时后对较长,前对花药2室,具横的位置,后对药室退化成1室。花柱先端2浅裂,裂片钻形,近相等。花盘平顶,具圆齿。小坚果近圆球形,黑色,具光泽。

约7—8种,分布于热带亚洲至澳大利亚。我国有1种,产西南至台湾。

1. **广防风** 马衣叶(种子植物名称),防风草(广州植物志,中国种子植物科属辞典),土防风(广东药店俗称),防风草、排风草、土藿香、落马衣、秒草、抹草、臭秒草、假豨蓂、芒草、大密草、荆芥、豨蓂草(广东),薄荷(广东阳山),白艾花(广州),旺草(广东大鱼山),蜜草(广东儋县,海口),臭草(广东澄迈),秒草、假藿香、臭秒草、大羊胡躁、假豨蓂、防风草、九层楼、土防风、七草(广西),防风草、豨蓂草(福建),野薄荷(福建沙县),猪麻苏(福建长汀),防风草、野苏麻(贵州兴义),土藿香(贵州荔波),野苏(四川金阳),野紫苏(四川布拖),癩蛤蚂(云南河口)茴草(中国植物科属检索表) 图版6

Epimeredi indica (Linn.) Rothm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **53**: 12. 1944——*Nepeta indica* Linn. Sp. Pl. 571. 1753——*Marrubium indicum* (Linn.) Burm. Fl. Ind. 227. 1768——*Anisomeles indica* (Linn.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 512. 1891; Merr. in Lingnam Agr. Rev. **2**: 136. 1925; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 926. 1936; et in Beih. Bot. Centralbl. **56B**: 458. 1937; Mukerj. in Rec. Bot. Surv. Ind. **14**(1): 152. 1940; Back. & Bakh. f. Fl. Java **2**: 624. 1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**: 34, f. 5. 1969——*Anisomeles ovata* R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, **2**: 364. 1811; J. F. Jacq. Ecol. **1**: t. 86. 1814—15; Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**: 59. 1830; Labiat. Gen. et Sp. 302. 1833; et in DC. Prodr. **12**: 455. 1848; Fl. Hongk. 278. 1861; Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. 19, Suppl. **1**: 375. 1843; Hook. in Journ. Bot. Kew. Misc. **2**: 358. suppl. t. 19. 1850; Hook. f. in Fl. Brit. Ind. **4**: 672. 1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **26**: 299. 1890; Dunn & Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 211. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 178. 1915; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 1012, f. 105, 11—16. 1936.

草本,直立,粗壮,分枝。茎高1—2米,四棱形,具浅槽,密被白色贴生短柔毛。叶阔卵圆形,长4—9厘米,宽2.5—6.5厘米,先端急尖或短渐尖,基部截状阔楔形,边缘有不规则的牙齿,草质,上面榄绿色,被短伏毛,脉上尤密,下面灰绿色,有极密的白色短绒毛,在脉上的较长,叶柄长1—4.5厘米;苞叶叶状,向上渐变小,均超出轮伞花

序,具短柄或近无柄。轮伞花序在主茎及侧枝的顶部排列成稠密的或间断的直径约2.5厘米的长穗状花序;苞片线形,长3—4毫米。花萼钟形,长约6毫米,外面被长硬毛及混生的腺柔毛,其间杂有黄色小腺点,内面有稀疏的细长毛,10脉,不明显,下部有多数纵向细脉,上部有横脉网结,齿5,三角状披针形,长约2.7毫米,边缘具纤毛,有时紫红色,果时增大。花冠淡紫色,长约1.3厘米,外面无毛,内面在冠筒中部有斜向间断小疏柔毛毛环,冠筒基部宽约1.7毫米,向上渐变宽大,至口部宽达3.5毫米,冠檐二唇形,上唇直伸,长圆形,长4.5—5毫米,宽3毫米,全缘,下唇几水平扩展,长9毫米,宽5毫米,3裂,中裂片倒心形,长约3毫米,宽约4.5毫米,边缘微波状,内面中部具髯毛,侧裂片较小,卵圆形。雄蕊伸出,近等长,前对稍长或有时后对较长,花丝扁平,两侧边缘膜质,被小纤毛,粘连,前对药室平行,后对药室退化成1室。花柱丝状,无毛,先端相等2浅裂,裂片钻形。花盘平顶,具圆齿。子房无毛。小坚果黑色,具光泽,近圆球形,直径约1.5毫米。花期8—9月,果期9—11月。

产广东,广西,贵州,云南,西藏东南部,四川,湖南南部,江西南部,浙江南部,福建及台湾;为一杂草,生于热带及亚热带地区的林缘或路旁等荒地上,海拔40—1580(—2400)米。印度,东南亚经马来西亚至菲律宾也有。模式标本采自印度。

全草入药,为民间常用药草,治风湿骨痛、感冒发热、呕吐腹痛、胃气痛、皮肤湿疹、搔痒、乳痈、疮癣、癰疮以及毒虫咬伤等症。

56. 簇序草属 ——— *Craniotome* Reichenb.

Reichenb. Icon. Exot. 1: 39, pl. 54. 1824.

多年生直立分枝草本,各部密被平展硬毛。叶具长柄,圆齿;苞叶在花枝最下部者与茎叶同形,在花枝上部者变小,呈苞片状。聚伞花序具梗,多花,蝎尾状,或偶有二歧状,多数密集排列成腋生或顶生下部常分枝的聚伞式圆锥花序。花小,具柄,其下有小苞片;小苞片线形,具缘毛。花萼卵珠状,果时近于壶状球形,喉部略收缩,内面在喉部上方有柔毛,10脉,齿5,近相等,其中最上1齿较大。花冠伸出萼筒,冠筒直而短,等粗,喉部略增大,冠檐二唇形,上唇直伸,短小,全缘,内凹,下唇较长,平展,3裂,中裂片最大,均呈卵圆形。雄蕊4,前对较长,均上升至上唇片之下,花药2室,室平叉开。花柱丝状,先端略增粗,近相等2浅裂。花盘平顶。子房无毛。小坚果近球状三棱形,细小,有光泽。

单种属,分布自尼泊尔经缅甸及老挝至越南北部。在我国见于云南和四川。

1. 簇序草 图版 7

