

无毛,冠筒长4毫米,直伸,冠檐二唇形,上唇直伸、椭圆形,扁平,长2毫米,先端微缺,下唇开张,长2.5毫米,3裂,裂片近等大或中裂片稍大,全缘。雄蕊4,前对较长,上升,只达裂片中部,几不超出花冠外,花药2室,室略叉开。花柱不超出雄蕊,先端相等2浅裂。花盘平顶。子房黄褐色,无毛。小坚果长圆形,长约1毫米,褐色,无毛。花期6—7月,果期7—8月。

产云南,贵州;生于石灰岩山地、开旷草地等处,海拔2000—2550米。不丹,尼泊尔,印度,阿富汗至埃塞俄比亚及非洲南部也有。模式标本采自尼泊尔。

全草含芳香油0.18%,油清香,用作酒类香精。全草又可入药,治胃痛、腹胀、呕吐、腹泻、急性胃炎、急慢性胃肠痛、疝气痛、感冒咳嗽等症,并可预防痢疾。

2. 台湾姜味草

Micromeria formosana Marquand in Hook. Icon. Pl. 33: pl. 3230. 1934.

多年生草本,通常高12厘米。茎直立或上升,多分枝,圆柱形,红带紫色,疏生蜷曲微柔毛。茎生叶具柄,柄长2—3毫米,微粗糙,叶片卵形,通常长7毫米,宽5毫米,先端微钝,基部近楔形,上面微粗糙,两面有贴生的腺点。轮伞花序少花,生于茎、枝上部;苞片叶状,小苞片不存在;花梗纤细,长不达1毫米,被微柔毛。花萼管状漏斗形,长2.5—3毫米,喉部宽1毫米,带紫色,外被微柔毛,散布多数金色明亮细小腺点,喉部有白色长毛,萼齿5,卵状三角形,近锐尖,通常长1毫米。花冠灰紫堇色,长5—7毫米,外面被短柔毛,疏布少数金色明亮细小腺点,冠檐二唇形,上唇卵形,径约2.5毫米,2裂,下唇3裂,裂片近圆形,径约1.5毫米。雄蕊4,二强,前对稍短于上唇片,后对几不超出冠筒喉部,花丝无毛,花药2室,室叉开。花柱丝状,长8毫米。花盘平顶。子房浅4裂。小坚果椭圆状长圆形,长几不及0.5毫米,光滑。(标本未见,摘自原描写)

产台湾。模式标本为根据 K. Yashiroda (no. 13) 所采的种子在英国邱园生长的活植物。

3. 小香薷(云南迪庆、中甸) 图版 51:1—5

Micromeria barosma (W. W. Smith) Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 932. 1936
——*Calamintha barosma* W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinburgh 9: 88. 1916;
Edinb. staff in ibid. 17: 244. 1929—30——*Satureia barosma* (W. W. Smith) Kudo
in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 99. 1929.

披散半灌木,丛状,极芳香,茎木质而宿存,其上发出多数放射状平铺的茎,有圆锥形的主根,其上有须根。茎多数,纤细,长20—40厘米,圆柱形,常带紫红色,密