

稍疏松,常具1—3个远隔的轮伞花序;花梗通常长2—3毫米,被短柔毛。花萼管状钟形,长4.5—5毫米,全部被柔毛,上唇外面无毛,暗紫色,齿披针形,边缘被缘毛。花冠长约7毫米,且细长花冠筒,玫瑰红紫色。花期7—8月。(标本未见,摘自原描写)

产黑龙江;生于砾石山坡上。苏联远东地区也有。模式标本采自黑龙江。

6. 斜叶百里香

Thymus inaequalis Klok. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 16: 303. 1954; et in Fl. URSS 21: 523. 1954.

多年生半灌木。茎纤细,弓形弯曲,不育枝从茎基部或根状茎长出,上升或平卧,被向下弯的短疏柔毛;花枝纤细,高达10厘米,上升,被向下弯的短疏柔毛。叶长圆状椭圆形或长圆状卵圆形,长3—12毫米,宽1—4毫米,先端锐尖或钝,基部渐狭成短柄,两侧不相等;边缘通常具有1—3对小齿,自基部向上1/3—1/4处被缘毛,两面无毛,脉5—7,多少有些弯曲,在下面明显突起,腺点小,明显或不明显,在叶腋有时长出具小叶簇的短枝,短枝也有时伸长成花枝。花序头状,疏松,有时在下部有不发育的轮伞花序;苞叶与茎叶同形;花梗长1—4毫米,密被柔毛;小苞片钻形,比花梗短或与花梗等长,被长缘毛。花萼管状钟形,长4—5毫米,下部被平展的疏柔毛,上部无毛或近无毛,上唇齿披针形或尖三角形,被短缘毛。花冠淡紫色,长达8毫米,外被短柔毛及腺点。雄蕊外伸或仅两枚外伸。花期7—8月。

产内蒙古北部,黑龙江(未见标本);生于山坡干燥处、阳坡草地或石砾地,海拔350—850米。苏联西伯利亚东部也有。模式标本采自苏联。

7. 拟百里香

Thymus proximus Serg. in Animadv. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 6—7:3. 1936; Klok. in Fl. URSS 21:545. 1954.

半灌木。茎匍匐,不粗壮,圆柱形;花枝四棱形或近四棱形,密被下曲的柔毛,毛在节间多少有些两面交互对生,高2—8厘米,有时分枝。叶椭圆形,稀卵圆形,花枝上的叶大多数长8—12毫米,宽3—5毫米,先端钝,基部渐狭成柄,全缘或具不明显的小锯齿,腺点在下面明显。花序头状或稍伸长,有时在下面具有不发育的轮伞花序;苞叶卵圆形或宽卵圆形,无柄,边缘在基部被少数缘毛;花梗长1—4毫米,密被向下弯的柔毛。花萼钟形,长3.5—4.5毫米,下部被疏柔毛,上部无毛,上唇齿三角形或狭三角形,被缘毛。花冠长约7毫米,外被短柔毛。雄蕊稍外伸。花柱外伸,先端2浅裂,裂片近相等。花期7—8月。

产新疆北部;生于山沟潮湿处或山顶阳坡,海拔2000—2100米。苏联也有。模