

毛,略二唇形,上唇3齿极小,三角形,下唇2齿稍长于上唇,披针形,果时花萼增大。花冠紫色或粉红色,长约2.5毫米,外被短柔毛,冠檐极短,上唇2圆裂,下唇较之略长,3裂,中裂片较长。雄蕊4,后对雌蕊能育,不超过上唇,前对雄蕊退化至极小。花柱先端2裂,微伸出花冠。小坚果灰褐色,球形,直径1.5毫米,具疏网纹,无毛。花期9—11月,果期10—12月。

产浙江,江西,湖北,四川,贵州,广西,广东及云南;生于疏林下,山坡草地上,海拔700—1600米。越南北部也有。模式标本采自贵州平坝。

全草入药,功效近石香薷。

10. 小鱼仙草(植物名实图考,滇南本草误作小仙草) 月味草(广东乐昌、惠阳、大埔),土荆芥(广东龙门),干汗草(广东军田),红花月味草、热痲草、假鱼香、土荆芥、姜芥、香花草(广东),野荆芥、假荆芥、土荆芥(广西),四方草(福建福安),石芥苧、痲子草、臭草、小本土荆芥(福建福州),大叶香薷、野香薷、野荆芥、霍乱草、痲子草(江西),山苏麻(贵州遵义),野荆芥、假荆芥、土荆芥(广西),疏花芥苧(种子植物名称) 图版64: 1—7

Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **20**:457. 1875; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:647. 1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:280. 1890; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**: 326, f. 98, E. 1897; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**:986. 1936; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:120, f. 22, a-f. 1969; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):213. 1974——*Lycopus dianthera* Buch.-Ham. in Roxb. Fl. Ind. **1**:145. 1820——*Orthodon diantherus* (Buch.-Ham.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:933. 1936——*Melissa nepalensis* Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:66. 1830——*Cunila nepalensis* D. Don, Prodr. Fl. Nep. 107. 1825——*Hedeoma nepalensis* (D. Don) Benth. Labiat. Gen. et Sp. 366. 1834; et in DC. Prodr. **12**:244. 1848——*Mosla ocimoides* Buch.-Ham. ex Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:66. 1830; Mukerj. in Bot. Sur. Ind. **14**:101. 1940——*Mosla remotiflora* Sun, 科学社生物所论文集, **7**:55. 1932; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:89. 1934, pro syn.——*Orthodon punctatum* (Thunb.) Kudo var. *tetrantherus* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:89. 1934——*Mosla lanceolata* auct. non (Benth.) Maxim.: Merr. in Lingnan Sci. Journ. **11**:55. 1932.

一年生草本。茎高至1米,四棱形,具浅槽,近无毛,多分枝。叶卵状披针形或菱状披针形,有时卵形,长1.2—3.5厘米,宽0.5—1.8厘米,先端渐尖或急尖,基部渐狭,

边缘具锐尖的疏齿,近基部全缘,纸质,上面榄绿色,无毛或近无毛,下面灰白色,无毛,散布凹陷腺点;叶柄长3—18毫米,腹凹背凸,腹面被微柔毛。总状花序生于主茎及分枝的顶部,通常多数,长3—15厘米,密花或疏花;苞片针状或线状披针形,先端渐尖,基部阔楔形,具肋,近无毛,与花梗等长或略超过,至果时则较之为短,稀与之等长;花梗长1毫米,果时伸长至4毫米,被极细的微柔毛,序轴近无毛。花萼钟形,长约2毫米,宽2—2.6毫米,外面脉上被短硬毛,二唇形,上唇3齿,卵状三角形,中齿较短,下唇2齿,披针形,与上唇近等长或微超过之,果时花萼增大,长约3.5毫米,宽约4毫米,上唇反向上,下唇直伸。花冠淡紫色,长4—5毫米,外面被微柔毛,内面具不明显的毛环或无毛环,冠檐二唇形,上唇微缺,下唇3裂,中裂片较大。雄蕊4,后对能育,药室2,叉开,前对退化,药室极不明显。花柱先端相等2浅裂。小坚果灰褐色,近球形,直径1—1.6毫米,具疏网纹。花、果期5—11月。

产江苏,浙江,江西,福建,台湾,湖南,湖北,广东,广西,云南,贵州,四川及陕西;生于山坡、路旁或水边,海拔175—2300米。印度,巴基斯坦,尼泊尔,锡金,不丹,缅甸,越南,马来西亚,日本(南部)也有。模式标本采自印度。

民间用全草入药,治感冒发热、中暑头痛、恶心、无汗、热疹、皮炎、湿疹、疮疥、痢疾、肺积水、肾炎水肿、多发性疖肿、外伤出血、鼻衄、痔瘕下血等症。此外又可灭蚊。

11. 长苞荠苎 土荆芥(广西兴安) 图版 64: 8

Mosla longibracteata (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):214. 1974—*Orthodon longibracteatus* C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax Sin. **10**(3):232. 1965.

一年生草本。茎高30—50厘米,四棱形,稜及节上被倒生短硬毛,多分枝,分枝斜向上。叶倒卵形或菱形,长1.6—3.3厘米,宽0.9—1.6厘米,先端钝,基部渐狭,下延成长6—12毫米的柄,边缘在中部以上具圆齿或圆齿状锯齿,下部全缘,纸质,两面均为榄绿色,无毛,下面被疏腺点。总状花序顶生于主茎及侧枝上,长6—11厘米;苞片卵状披针形至披针形,长4—6.5毫米,宽0.8—3毫米,有时最下部的叶状,远较花梗长。花萼钟形,长约2.7毫米,宽约2.2毫米,外面被微柔毛但沿脉上被倒生短硬毛,满布黄色腺点,萼齿5,后3齿呈钝三角形,中齿极小,前2齿披针形,其长微超过

图版 64: 1—7. 小鱼仙草 **Mosla dianthera** (Buch.-Ham.) Maxim., 1. 侧生花枝; 2. 花, 侧面观; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 雌蕊; 6. 小坚果, 背面观; 7. 植株顶部。8. 长苞荠苎 **Mosla longibracteata** (C. Y. Wu et Hsuan) C. Y. Wu et H. W. Li, 花枝。(曾孝濂绘)

