

米;冠筒长约9毫米,近等粗,基部宽1.5毫米,至喉部宽达2毫米,外面上部疏被微柔毛,内面离基部2.5毫米处有近水平向的小疏柔毛毛环;冠檐外疏被微柔毛,二唇形,上唇长约2毫米,先端微凹,下唇长约3毫米,3裂,中裂片最宽大,内面极密被白色髯毛及红色腺点。雄蕊4,前对远伸出花冠外,后对内藏,花丝扁平,无毛,花药2室,室平叉开。花柱丝状,伸出花冠外。花盘前方呈指状膨大。子房裂片无毛。花期10月。

产福建西部,广东北部;生于山谷疏林下,海拔600—700米。模式标本采自广东新丰。

4. 腺毛香简草 腺毛霜柱(植物分类学报 10 卷 3 期)

Keiskea glandulosa C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(3): 236, pl. XLIV. 1965.

直立草本。茎高约30厘米,圆柱形,上部被有白色具节卷曲长柔毛,下部毛脱落而近无毛。叶卵状长圆形或长圆形,上部的较大,长6—9厘米,宽2.5—4厘米,先端渐尖或钝,基部圆形或楔形,下部的叶较小,长仅3.5厘米,基部渐狭下延至叶柄,边缘具浅圆齿状锯齿,纸质,上面褐榄绿色,中脉上被短柔毛,其余部分为微柔毛及尘状毛被,下面略淡,中脉上被极疏具节柔毛;叶柄长0.7—3厘米,腹平,被卷曲的腺疏柔毛,背面具条纹。总状花序顶生,长约8厘米;苞片卵状钻形,长约7毫米,宽约2.5毫米,先端尾状渐尖,边缘有白色纤毛;花梗短,长约2毫米,被腺疏柔毛,序轴毛被同茎。花萼钟形,长4毫米,外面被具节腺疏柔毛,内面在齿间有不明显的毛束,萼齿5,披针形,长约2.3毫米。花冠干后唇片仍为浅紫色,长8毫米,外面被微柔毛,内面在雄蕊着生处即冠筒稍下方有柔毛状髯毛环,冠筒基部宽约1毫米,向上渐扩大,至喉部宽达4毫米,冠檐二唇形,上唇较长,长约2.2毫米,2裂,下唇3裂,裂片近等大,圆形,长约1.8毫米。雄蕊内藏,前对长约3毫米,微露出,花丝扁平,无毛,花药2室,室略叉开。花柱丝状,长8.5毫米,超出花冠,先端近相等2浅裂。花盘环状。子房裂片无毛。花期11月。

产福建。模式标本采自福建莲花山。

5. 香简草(云南彝良) 四川霜柱(植物分类学报 10 卷 3 期) 图版 76

Keiskea szechuanensis C. Y. Wu in Act. Phytotax **10**(3):236, pl. XLV. 1965

图版 76: 香简草 *Keiskea szechuanensis* C. Y. Wu, 1. 花枝; 2. 花, 侧面观; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 雌蕊; 6. 苞片, 内面观。(曾孝濂绘)