

枝并密生叶片，长长地抽出常成鞭状小枝。叶卵形至披针形，长 0.5—9 (17) 厘米，宽 0.3—3 (4.5) 厘米，锐尖或渐尖，极少钝形，中部以下渐渐地楔状延长成具宽翅的柄，边缘有具胼胝尖的锐锯齿，膜质至草质，上面亮绿色，疏生小刚毛状微柔毛，下面淡绿色，常带青紫色，除脉上被细微柔毛外余部无毛，侧脉约 3 对，上面明显，下面极明显，具疏散的细网脉；叶柄长 0.5—5 厘米，具翅，有细微柔毛。总状花序顶生于枝上，长 6—10 厘米，疏花，密生微柔毛，具头状腺毛，聚伞花序 1—3 花，通常 1 花，具梗，总梗长约 2 毫米；苞叶披针形或线形，着生于下部轮伞花序上者较大，通常长 12 毫米，外被微柔毛，边缘具齿及缘毛；小苞片钻形，长 1—3 毫米，外被微柔毛；花梗长 4—10 毫米，被微柔毛。花萼钟形，长达 3 毫米，外被腺微柔毛，不明显 10 脉，萼齿 5，近等大，三角形，锥状长尖，后一齿较宽大。花冠紫蓝色，漏斗状管形，长达 2.5 厘米，冠筒长 19 毫米，向上渐扩展，基部径约 2 毫米，喉部宽约 1 厘米，外面被微柔毛，内面下部略被微柔毛，冠檐二唇形，上唇长 3 毫米，2 裂，下唇长 6 毫米，平展，裂片椭圆形，中裂片较长。雄蕊 4，下倾，插生于喉部，显然伸出，花丝扁平，二侧边缘多少被微柔毛，花药椭圆形，2 室，室汇合。花柱与花冠等长或超出花冠，先端 2 裂。花盘前方呈指状膨大，其长度超过子房。子房无毛。花期 9—10 月。

产浙江西南部，江西，福建，湖南及广东；生于草坡阴地及亚热带常绿林下，海拔 540—1400 米。模式标本采自浙江云和。

6. 贵州四轮香 *Hanceola cavaleriei* (Lévl.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:

55.1929; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8(1): 59. 1959——*Hancea cavaleriei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9:224. 1911; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:153. 1915.

植株全无毛。茎粗壮，具沟，稍具翅。叶长 2—5 厘米，宽 1—3 厘米，先端渐尖，基部长楔状渐狭下延至具翅的柄，边缘近基部全缘，向上有具短尖头的深牙齿，上面深绿色，下面苍白色。花紫堇色，组成稀疏短总状花序；苞片披针形，具牙齿。花萼明显

图版 84: 1—6. 块茎四轮香 *Hanceola tuberifera* Sun, 1. 植株; 2. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊; 3. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 4. 雌蕊; 5. 花冠唇边的微柔毛; 6. 花冠筒内的具节疏柔毛。7—15. 出蕊四轮香 *Hanceola exserta* Sun, 7. 上部花枝; 8. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊、苞片及小苞片; 9. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 10. 雌蕊; 11. 嫩枝上的具节细平伏毛, 12. 叶上面的具节平伏毛; 13. 茎及花上的微柔毛; 14. 花冠筒内的微柔毛; 15. 雄蕊上的微柔毛; 16. 雄蕊。(刘春荣绘)

8 脉,二唇形,下唇较伸长,有粗壮 2 齿,上唇有 1 齿较宽,2 短齿着生于二唇之间。花冠伸长,长超过花萼 10 倍,冠筒直或弯曲,冠檐二唇形,唇片圆形,近于全缘。雌、雄蕊近于伸出。小坚果褐色,具不明显脉纹,卵珠状,微粗糙。花、果期 9 月。(标本未见,摘自原描写)

产贵州。模式标本采自贵州平坝。

7. 高坡四轮香

Hanceola labordei (Lévl.) Sun, 科学社生物所论文集 12(3): 123. 1942, in nota—*Hancea labordei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 12:22. 1913.

植株极无毛。茎伸长,纤细,具沟。叶披针形,先端渐尖。基部楔状渐狭至具翅的叶柄,边缘除基部楔状全缘外均具牙齿,长 10 厘米,宽 2.5 厘米。花美丽,玫瑰红色,花萼具线形齿,但具条纹,花冠一侧肿胀,长 4 厘米。种子褐色,卵球形,大,长 2 毫米。(标本未见,摘自原描写)

产贵州。模式标本采自贵州青岩高坡山洞石场。

8. 龙溪四轮香

Hanceola mairei (Lévl.) Sun, 科学社生物所论文集 12(3): 123. 1942, in nota—*Hancea mairei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 11:297. 1912.

茎具条纹,无毛。叶具长柄,披针形,全缘但上部分具圆齿,上面深绿色,无毛,下面灰白色,疏生长柔毛。花浅蓝色,组成顶生穗形总状花序。花萼小,变无毛,具脉。花冠具极短的小疏柔毛,冠筒甚伸出。花柱极伸长。(标本未见,摘自原描写)

产云南东北部。模式标本采自云南龙溪海拔 750 米处。

族 2. 山香族——HYPTIDEAE C. Y. Wu

C. Y. Wu in Addenda 586.——*Ocimoideae* subtrib. *Euocimeae* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2:1163. 1876, p. p.——*Ocimoideae* subtrib. *Hyptidinae* Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:208, 332. 1897——*Ocimeae* subtrib. *Hyptidinae* Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:146. 1929.

86. 山香属——*Hyptis* Jacq.

Jacq. Collect. 1:101, 103. 1786, nom. conserv.; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 64. 1833; Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: