

8 脉,二唇形,下唇较伸长,有粗壮 2 齿,上唇有 1 齿较宽,2 短齿着生于二唇之间。花冠伸长,长超过花萼 10 倍,冠筒直或弯曲,冠檐二唇形,唇片圆形,近于全缘。雌、雄蕊近于伸出。小坚果褐色,具不明显脉纹,卵珠状,微粗糙。花、果期 9 月。(标本未见,摘自原描写)

产贵州。模式标本采自贵州平坝。

7. 高坡四轮香

Hanceola labordei (Lévl.) Sun, 科学社生物所论文集 12(3): 123. 1942, in nota—*Hancea labordei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 12:22. 1913.

植株极无毛。茎伸长,纤细,具沟。叶披针形,先端渐尖。基部楔状渐狭至具翅的叶柄,边缘除基部楔状全缘外均具牙齿,长 10 厘米,宽 2.5 厘米。花美丽,玫瑰红色,花萼具线形齿,但具条纹,花冠一侧肿胀,长 4 厘米。种子褐色,卵球形,大,长 2 毫米。(标本未见,摘自原描写)

产贵州。模式标本采自贵州青岩高坡山洞石场。

8. 龙溪四轮香

Hanceola mairei (Lévl.) Sun, 科学社生物所论文集 12(3): 123. 1942, in nota—*Hancea mairei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 11:297. 1912.

茎具条纹,无毛。叶具长柄,披针形,全缘但上部分具圆齿,上面深绿色,无毛,下面灰白色,疏生长柔毛。花浅蓝色,组成顶生穗形总状花序。花萼小,变无毛,具脉。花冠具极短的小疏柔毛,冠筒甚伸出。花柱极伸长。(标本未见,摘自原描写)

产云南东北部。模式标本采自云南龙溪海拔 750 米处。

族 2. 山香族——HYPTIDEAE C. Y. Wu

C. Y. Wu in Addenda 586.——*Ocimoideae* subtrib. *Euocimeae* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2:1163. 1876, p. p.——*Ocimoideae* subtrib. *Hyptidinae* Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:208, 332. 1897——*Ocimeae* subtrib. *Hyptidinae* Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:146. 1929.

86. 山香属——*Hyptis* Jacq.

Jacq. Collect. 1:101, 103. 1786, nom. conserv.; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 64. 1833; Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: