

8 脉,二唇形,下唇较伸长,有粗壮 2 齿,上唇有 1 齿较宽,2 短齿着生于二唇之间。花冠伸长,长超过花萼 10 倍,冠筒直或弯曲,冠檐二唇形,唇片圆形,近于全缘。雌、雄蕊近于伸出。小坚果褐色,具不明显脉纹,卵珠状,微粗糙。花、果期 9 月。(标本未见,摘自原描写)

产贵州。模式标本采自贵州平坝。

7. 高坡四轮香

Hanceola labordei (Lévl.) Sun, 科学社生物所论文集 12(3): 123. 1942, in nota—*Hancea labordei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 12:22. 1913.

植株极无毛。茎伸长,纤细,具沟。叶披针形,先端渐尖。基部楔状渐狭至具翅的叶柄,边缘除基部楔状全缘外均具牙齿,长 10 厘米,宽 2.5 厘米。花美丽,玫瑰红色,花萼具线形齿,但具条纹,花冠一侧肿胀,长 4 厘米。种子褐色,卵球形,大,长 2 毫米。(标本未见,摘自原描写)

产贵州。模式标本采自贵州青岩高坡山洞石场。

8. 龙溪四轮香

Hanceola mairei (Lévl.) Sun, 科学社生物所论文集 12(3): 123. 1942, in nota—*Hancea mairei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 11:297. 1912.

茎具条纹,无毛。叶具长柄,披针形,全缘但上部分具圆齿,上面深绿色,无毛,下面灰白色,疏生长柔毛。花浅蓝色,组成顶生穗形总状花序。花萼小,变无毛,具脉。花冠具极短的小疏柔毛,冠筒甚伸出。花柱极伸长。(标本未见,摘自原描写)

产云南东北部。模式标本采自云南龙溪海拔 750 米处。

族 2. 山香族——HYPTIDEAE C. Y. Wu

C. Y. Wu in Addenda 586.——*Ocimoideae* subtrib. *Euocimeae* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2:1163. 1876, p. p.——*Ocimoideae* subtrib. *Hyptidinae* Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:208, 332. 1897——*Ocimeae* subtrib. *Hyptidinae* Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:146. 1929.

86. 山香属——*Hyptis* Jacq.

Jacq. Collect. 1:101, 103. 1786, nom. conserv.; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 64. 1833; Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2:

1178. 1876; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:

333. 1897——*Mesosphaerum* R. Br. Hist. Jamaica 257. 1756

直立、分枝草本或半灌木、灌木，有香气或无香气。叶对生，具齿缺。花小或中等大，排列成头状花序或稠密的穗状花序，或为疏花的圆锥花序；苞片钻形或刺状。花萼管状钟形或管形，直立或斜生，具10脉，萼口内面有柔毛簇或无，萼齿5，近相等，短尖或锥尖，直立，果时花萼增大。花冠筒圆筒形或一边稍膨胀，至喉部近等大或略扩展，冠檐二唇形，具5裂片，上唇2裂，裂片直伸、平展或外反，下唇3裂，中裂片囊状，花时反折，全缘或微缺，基部收缩，具胼胝体边缘或两边具向前的齿，侧裂片相似，明显，与上唇裂片或中裂片靠近。雄蕊4，前对较长，下倾，花丝分离，无基生附属器，花药汇合成一室。花柱先端2浅裂或近全缘。花盘全缘或前方微膨大。小坚果卵形或长圆形，光滑或点状粗糙，少数种具膜状翅。

约350—400种，均产美洲热带至亚热带及西印度群岛地区，数种逸生于全世界热带成为杂草。我国有4种，均见于南部沿海。

分 种 检 索 表

1. 轮伞花序多花，聚集成头状花序或穗状花序。
 2. 头状花序腋生，球形或近球形。
 3. 头状花序直径约1厘米；总梗长0.5—1.6厘米 3. 短柄吊球草 *H. brevipes* Poit.
 3. 头状花序直径约1.5厘米；总梗长5—10厘米 2. 吊球草 *H. rhomboidea* Mart. & Gal.
 2. 穗状花序通常顶生，长圆形，不间断，长1.8—6.5厘米 4. 穗序山香 *H. spicigera* Lam.
1. 聚伞花序(1)2—5花，着生于逐渐变小的叶腋内，成总状花序或圆锥花序 1. 山香 *H. suaveolens* (Linn.) Poit.

组1. 山香组——Sect. *Mesosphaeria* Benth. Labiat Gen. et Sp. 122. 1833; et in DC. Prodr. **12**:122. 1848; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**: 338. 1897.

花聚集成聚伞花序或疏松少花的小头状花序，苞片小而钻形或近无，花具梗。果萼斜钟形，萼口截形，喉部内面有柔毛簇或稀无毛，齿直，钻形。花冠筒内藏或短伸出。草本或稀为灌木。