

面具稜,深褐色,基部具二白色着生点。

产台湾及广东海南;生于低海拔开旷荒地。原产墨西哥,现成为全热带杂草。

组3 穗序组——Sect. *Spicaria* Benth. *Labiata. Gen. et Sp.* 78. 1833; et in DC *Prodr.* **12**:347. 1848; Briq. in Engl. u. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* **4**, **3a**:347. 1897.

轮伞花序多花,排列成密集或基部多少间断的穗状花序;苞片多数,贴向,线状钻形;花无柄。果萼直立,齿钻形。花柱先端2浅裂。草本。

4. 穗序山香

Hyptis spicigera Lam. *Encycl.* **3**:185. 178. Benth. *Labiata. Gen. et Sp.* 78. 1833; et in DC. *Prodr.* **12**:87. 1848; Miq. *Fl. Ind. Bat.* **2**:958. 1858; Hayata in *Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo* **30**:226. 1911; Matsum. *Ind. Pl. Jap.* **2**(2):540. 1912; Matsum. et Kudo in *Bot. Mag. Tokyo* **26**:301. 1912; Merr. *Enum. Philip.* **3**:417. 1923; Kudo in *Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ.* **2**:150. 1929; H. Keng in *Gard. Bull. Singapore* **24**:95. 1969——*Pycnanthemum elongatum* Blanco. *Fl. Filip.* ed. 2, 333. 1845; ed. 3, **2**:252. 1878.

一年生、直立草本。茎高1—1.5米,四棱形,具槽,稜上粗糙。叶披针形或卵状披针形,长2.5—7.5厘米,宽1—2.5厘米,先端锐尖或渐尖,基部楔形,边缘具小锯齿,纸质,上面榄绿色,被疣状毛被,下面较淡,脉上被短硬毛,其余部分具小腺点;叶柄长3—22毫米,粗糙。轮伞花序多花,密集成1.8—6.5厘米、宽1—1.3厘米的不间断圆筒形穗状花序,此花序顶生或在上部叶腋内侧生;苞片钻形,具缘毛,与花萼等长。果时花萼筒状增大,长约7毫米,宽约3毫米,外面被短硬毛及透明腺点,10肋显著,肋间弧形横脉明显,萼齿5,钻形,长约2毫米。小坚果小,长约1毫米,宽0.6毫米,腹面具稜,褐色,长圆形。

产台湾。原产热带美洲,现成为在印度尼西亚,菲律宾逸生的杂草。

族3. 香茶菜族——PLECTRANTHEAE C. Y. Wu

C. Y. Wu in *Addenda* 586——*Ocimoideae* subtrib. *Euocimeae* Benth. in Benth. et Hook. f. *Gen. Pl.* **2**:1163. 1876. p. p.——*Subfam. Ocimoideae* subtrib. *Plectranthinae* Briq. in Engl. u. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* **4**, **3a**:208, 348. 1897——*Ocimeae* subtrib. *Plectranthinae* Kudo in *Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ.* **2**:118. 1929.